

173
JOSEPHI JACOBI PLENCK,

*Chirurgiæ Doctoris, nec non Chirurgiæ, Anatomes
atque Artis Obstetriciæ Professoris Regii, publici ac
ordinarii in Regia Universitate Budensi.*

DOCTRINA DE

MORBIS CUTANEIS

QUA HI MORBI IN SUAS CLASSES, GENERA
ET SPECIES REDIGUNTUR.



Editio secunda, aucta.

V I E N N Æ,
APUD RUDOLPHUM GRÆFFER.

I 7 8 3.

V I R O
PERILLUSTRI, EXPERTISSIMO,
DOCTISSIMO, AC CELEBERRIMO
JOANNI ALEXANDRO
BRAMBILLA
SAC. CÆS. REG. APOST. MAJ.
CHIRURGO PRIMARIO
NEC NON

EXERCITUM ET PRÆTORIANORUM IM-
PERIALIUM CHIRURGO SUPREMO
ACADEMIÆ CHIRURGICÆ REGIÆ
PARISIENSIS, MONTISPESUL.
BONONIENSIS ET MANTI-
NENS. MEMBRO

Hoc qualecunque opusculum in amicitiae,
observantiaeque monumentum

DEDICAT ET CONSECRAT

AUTHOR,

P R Æ F A T I O.

MORBORUM, qui cutem humanam affligunt, multitudo, atque varietas, causarum, a quibus ii proveniunt, obscuritas, & quæ inde nascitur sanandi difficultas, diversitasque, hanc medicinæ, chirurgiæque doctrinam tyronibus difficillimam & vix extricabilem reddidere. Authores demum, quos consultum adire licet, pauci sunt, quorum alii hoc, licet omnis ævi frequens morborum genus, nonnisi citissimo tetigere calamo; alii vago ac non constanti nominum usu diagnosim, curandique rationem effecere incertam.

Hæc sunt, quæ me incitabant, ut hanc vastam indigestamque horum morborum molem in systema redigere adlaborarem. Opusculum hoc, quod in usum meorum Auditorum concinnaveram, centum & quindecim genera complectitur affectuum cutaneorum; morbos chronicos diligenter descripsi, exanthematum autem febrilium solum adjeci differentiam & diagnosim, qua a

P R Æ F A T I O.

se & a similibus distinguantur; curatio enim exanthematum febrilium in sola sanatione febris, a qua profluunt, consistit, quæ ad aliam pathologiæ spartam pertinet.


Multum equidem, gratus fateor, celeberrimis viris, qui nuper generica morborum systemata condidere, SAUVAGESIO, LINNÆO, VOGELIO, MACBRIDIO, CULLENIO, SAGARO, HARTMANNO, LORRYO, DANIELIO debeo, quorum systematibus sæpe cum uberrimo fructu usus sum, nec tamen superfluam me navasse operam opinor, si ea attendas, quæ adje-
ci, correxi, dilucidavi.



CLASSES

MORBORUM CUTANEORUM.

- I. CLASSIS. MACULÆ, *die Flecke.*
- II. ——— PUSTULÆ, *die Eiterblattern.*
- III. ——— VESICULÆ, *die Wasserblattern.*
- IV. ——— BULLÆ, *die Blasen.*
- V. ——— PAPULÆ, *die Knoten.*
- VI. ——— CRUSTÆ, *die Rauden.*
- VII. ——— SQUAMMÆ, *die Schuppen.*
- VIII. ——— CALLOSITATES, *die Schwüllen.*
- IX. ——— EXCRESCENTIÆ CUTANÆ,
die Hautgewächse.
- X. ——— ULCERA CUTANEA, *die Haut-
geschwüre.*
- XI. ——— VULNERA CUTANEA, *die
Hautwunden.*
- XII. ——— INSECTA CUTANEA, *die Haut-
insekten.*
- XIII. ——— MORBI UNGUIUM, *die Nägel-
krankheiten.*
- XIV. ——— MORBI PILORUM, *die Haar-
krankheiten.*



GENERA ET SPECIES MORBORUM CUTANEORUM.

CLASSIS I. MACULÆ.



Maculæ fuscæ.

Lentigo, die Sommersprosse.

Ephelis, die Leberflecke.

Fuscedo cutis, die braune Haut.

Flavedo cutis, die gelbe Haut.

Maculæ rubræ.

Gutta rosacea, der Kupferbandel.

Stigma, der rothe Punkt.

Erythema, die Hautröthe.

Morbilli, die Kindsflecken.

Scarlatina, der Scharlachauschlag.

Urticaria, der Brennesselauschlag.

Maculæ venereæ, die venerische Flecke.

Effleræ, die flache rothe Flecke.

Psydraciæ, die erhobene rothe Flecke.

Rubedo cutis, die rothe Haut.

Zona seu *Zoster*, *die Feuergürtel.*

Macula lata Plateri, seu *Ignis sacer*, *der Feuerfleck.*

Maculae lividae.

Ecchymoma, *der blaue Fleck.*

Livor cutis, *die schwarzblaue Haut.*

Vibex, *der Streif.*

Maculae scorbuticae, *die Scharbocksflecke.*

Maculae gangranosa, *die Brandflecke.*

Petechiae, *die Petechen.*

Maculae nigrae.

Melas, *der schwarzgefleckte Ausatz.*

Melasma, *der schwarze Fleck.*

Noma, *der Kinderbrand, oder Todtenwurm.*

Nigredo cutis, *die schwarze Haut.*

Maculae albæ.

Alphos, *der weisgefleckte Ausatz.*

Albor cutis, *die weiße Haut.*

Pallor cutis, *die bleiche Haut.*

Maculae incerti coloris.

Maculae maternæ, *die Muttermahle.*

Maculae artificiales, *die gekünstelte Flecke.*

Cutis variegata, *die gefleckte Haut.*

Cutis fucata, *die geschminkte Haut.*

Cutis unguosa, *die glänzende Haut.*

CLASSIS II. PUSTULÆ.

Pustulæ, *die Eiterfinnen.*

Scabies, *die Krätze.*

Variolæ, *die Kindspocken.*

Varicellæ, *die unächten Kindspocken.*

Terminthus, *die Erbsenblattern.*

CLASSIS III. VESICULÆ.

Sudamen, *die Schweishblattern.*

Miliare, *die Frisfelblattern.*

Hydatis, *die Wasserblasen.*

Vesiculæ cristallinæ genitalium, *die Crystallblattern
der Schaamtheilen.*

Uritis, *die Brennblattern.*

CLASSIS IV. BULLÆ.

Phyma, *die Eiterblasen.*

Bullæ, *die Wasserblasen.*

Pemphigus, *der Blasenausschlag.*

CLASSIS V. PAPULÆ.

Vari, *die Finnen.*

Grutum, *der Gries.*

Herpes seu Serpigo, *die Flechte.*

Cutis anserina, *die Gänshaut.*

Tuberculum, *der Knöte.*

Phygethlon, *die rothe Knoten.*

Lepra, der Ausatz.

Elephantiasis, der Elefantenausatz.

CLASSIS VI. CRUSTÆ.

Crusta, die Raude.

Eschara, der Schorf.

Achores, die Kopfraude.

Crusta capitis neonatorum, der Kneis.

Crusta lactea, der Milchgrind.

Tinea, der Grind.

Mentagra, der Kieferaussatz.

Malum mortuum, das todte Uebel.

Exanthema labiale, der Lippenausschlag.

Exanthema subaxillare, der Achselhöhlenschlag.

CLASSIS VII. SQUAMMÆ.

Furfuratio, die Hautkleien.

Desquammatio, das Abschuppen der Haut.

Exuvia epidermidis, der Abgang der Oberhaut.

Porrigo, der Kleiengrind.

Lichen, der Zitterich.

Impetigo, der Kleienausatz.

Ichthyosis, der Fischschuppenausatz.

Tyriasis, der Schlangenausatz.

Asperitas cutis, die Rauigkeit der Haut.

Rugositas cutis, die Runzeln der Haut.

CLASSIS VIII. CALLOSITATES.

Callus, *die Schwülle.*

Cicatrix, *die Maser.*

Clavus, *das Hüneraug.*

CLASSIS IX. EXCRESCENTIÆ
CUTANEÆ.

Verruca, *die Warze.*

Cornua, *die Hauthörner.*

Hystricismus, *der Stachelausatz.*

Condyloma, *die Feigwarze.*

Frambæsia, *der Schwammformige Ausatz.*

CLASSIS X. ULCERA CUTANEA.

Excoriatio purulenta, *die Hautschwörung.*

Intertrigo, *der Frat.*

Aphthæ, *die Mundschwämchen.*

Fissuræ, *das Hautausspringen.*

Rhagades, *die Hautschrunden.*

CLASSIS XI. VULNERA CU-
TANEA.

Excoriatio cruenta, *die Hautausschärfung.*

Scissura, *der Schnitt.*

Pressura, *der Zwicker.*

Morsus, *der Bis.*

Punctura, *der Stich.*

Idus. ab insecto, *der Insekten Stich.*

CLASSIS XII. INSECTA CUTANEA.

Phthiriasis, *die Lausfucht.*

Helmintiasis, *die Hautwurmsucht.*

Malis, *die Insektengeschwülste.*

Crinones, *die Miteßer.*

CLASSIS XIII. MORBI UNGUIUM.

Seline, *der weiße Nagelflecke.*

Ecchymoma, *der blaue Nagelflecke.*

Gryphosis, *die Nagelkrümmung.*

Fissura unguium, *der Nagelspalt.*

Tinea unguium, *der Nagelgrind.*

Mollities unguium, *die Weichheit der Nägel.*

Scabrities unguium, *die Höckerigkeit der Nägel.*

Pterigium unguis, *das Nagelfell.*

Arctura unguis, *der Nagelzwang, das Nagelgeschwür.*

Deformitas unguis, *die Ungestalttheit der Nägel.*

Lapsus unguis, *der Abfall der Nägel,*

CLASSIS XIV. MORBI PILORUM.

Calvities, *der Kahlkopf.*

Hirsuties, *die Haarigkeit.*

Xerasia, *die Dünhaarigkeit.*

Trichoma, *der Wichtelzopf.*

Fissuræ capillorum, *die gespaltete Haare.*

Canities, *der Graukopf.*





D E
MORBIS CUTANEIS
G E N E R A T I M.

MORBI, qui cutem ejusque partes infestant, *cutanei* vocantur.

Hi dividi solent

1. in *acutos*, qui cum febre erumpunt, & cum illa evanescunt
2. in *chronicos*, qui sine febre sunt & ut plurimum diu durare assuescunt.

Ast facilioris intellectus gratia omnes morbos cutaneos in sequentes, a morbi indole petitas, XIV divido classes.

CLASSIS I. MACULÆ.

Sunt locales coloris nativi mutationes in cute.

SEDES materiæ morbosæ intra cutem & epidermidem in reticulo celluloso epidermidis est.

COLOR macularum est varius, ruber, fuscus, lividus, niger, albus.

Demum hæ maculæ, vel *solitariae*, vel *agminatæ* erumpunt.

CURATIO pro materiæ morbosæ diversitate diversa est.
SPECIES macularum sunt sequentes.

L E N T I G I N E S.

Sunt maculæ fuscæ, quæ colore, figura & magnitudine lentes referunt.

PARTES foli expositæ, ut facies, dorsa manuum, rarius antica crurum superficies, his maculis affici solent.

Puellas albidas cum ruffis capillis maxime aggreditur lentigo. Æstate augmentur, & hieme decrescunt hæ maculæ.

Cum autem lentigo in partibus non insolatis etiam oriatur, & moniales, soli non expostas, etiam afficiat, atque ulcera in lentiginosis cacoetha sæpe evadant, hinc peculiaris cacochymia *causa* lentiginis esse videtur.

CURATIO. Cum specificum cacochymix lentiginosæ remedium adhuc ignoretur, hinc depurantia generalia *interne* adhibeantur. Serum lactis tamarindinatum & juscula ex chærophyllo & aliis herbis hepaticis, utilia deprehendi.

Externe acetum armoraciæ, * fel taurinum, **
pasta amygdalarum amararum, lac sulphuris,
aqua

* Cel. KRÜNIZ *oeconomische Encyclopedie* 2. Vol. pag. 127.

** Cel. GEOFFROI in *Mémoires de l'Academ. de Scienc.* adversus lenticulas seu lentigines faciei cosmeticum
ex

aqua phagædenica, & solutio vitrioli albi laudatur.

EPHELIS.

Est macula fusca, lata, solitaria vel agminata.

SPECIES ephelidum sunt:

1. *EPHELIS SOLARIS*, quæ in facie & manu ab insolatione in teneris puellis observatur. *Præcavetur* umbraculis, pileo magno, chirothecis.

Curatur lavatorio ex oxycrato, aqua camphorata, petrosellino in aqua frigida macerato, pasta amygdalarum.

2. *EPHELIS IGNEALIS*. Post cutis ambustionem remanet, etiam in feminarum tibiis & femoribus observatur, quæ hyeme foculos pedibus supponunt. Etiam a vesicatorio, si cuticula aufertur, sæpe fusca & lata macula diu remanet.

Curatio a tempore expectanda.

3. *EPHELIS GRAVIDARUM*. Maculæ fuscae, solitariae, palman late, frontem præcipue afficientes, in gravidis observantur, quas *maculas gravidarum* vocant.

Hæ maculæ post partum evanescent.

ex felle tauri, oleo tartari per deliquium & aqua, laudat. Cel. HARTMANNUS p. 794. ex bile cosmeticum parat, de quo dicit: *ad miraculum usque albedinem cuti conciliat.*

4. *EPHELIS HEPATICA*. In virginibus difficulter menstruantibus, & quandoque in viris hæmorrhoidæ cæca laborantibus, & in aliis, quibus hepar afficitur, observantur hæ maculæ, quas etiam *Hepatizon* dicunt.

Curatio exigit, ut fluxus retentus restituatur. *Externe* applicantur, quæ in lentigine & ephelide solari laudantur.

5. *EPHELIS NEUNATORUM*. Est macula lutea, quæ hinc inde in infantibus neonatis observatur. *Curatur* ut icterus.

FUSCEDO CUTIS.

Est fuscedo non maculosa, sed diffusa per faciem, manus, vel totum corpus.

SPECIES fuscedinis sunt:

1. *FUSCEDO ÆTATIS*. Albedo infantum intra aliquot menses in subluteum vel subflavum colorem abit. Viris plerisque, senibus autem omnibus cutis fusca fit.
2. *FUSCEDO SOLARIS*. Solis ardor in saturando corporis colore magnam vim habet. Europæis candidis pars frontis pileo tecta, aut pars brachii, vestibus contenta, a reliqua nuda facie nudaque manu distat. Milites multa experti, & peregrinatores, qui calidissimas regiones frequentarunt, e terris remotis faciem fuscā vel atrā referunt, quam successive in patria iterum amittunt. At feminae in Asia, gynæceis reclusæ, manent albæ.

In climate calidissimo fusci sunt europæi, & in Europa æthiopes aliquantum albidiores fiunt. *Curatio* fuscedinis a remediis *cosmeticis* expectari, rarissime obtineri potest.

3. *FUSCEDO NATIVA*. Æthiops cum albo homine mulattos flavos gignit, qui etiam prodeunt, si mulatti cum mulattis rem habeant. Si vero mulatti cum albo coiverunt, fœtus prodit europæo propior, & post quartam generationem homo ab europæo non diversus. Si vero cum æthiope rem habeant mulatti, æthiopi propior generatur proles, & post quartam generationem verus redit æthiops. Demum in multis europæis feminis regio pubis & areolæ mammarum fuscae, subinde nigricantes sunt.

FLAVEDO CUTIS.

Est cutis flavedo in tota facie vel toto corpore.

1. *FLAVEDO ICTERITIA* ab ictero seu bile, in sanguinem redeunte, pendet. V. *Icterus*.
2. *FLAVEDO A SUGILLATIONE*. Ecchymosis livida, quamprimum resolvi incipit, flavescit; solitarii enim globuli sanguinis, multo fero diluti, flavescunt.
3. *FLAVEDO NATIVA*. In mediterraneis Æthiopiarum locis flavæ sunt gentes integræ.

GUTTA ROSACEA.

Est corymbus macularum rubrarum in facie & naso. SPECIES guttæ rosacæ sunt:

1. *GUTTA ROSACEA SIMPLEX* est rubedo nasi & partium adjacentium absque omni asperitate, efflorescentia, pruritu & desquamatione, diu permanens.

Curatur purgantibus.

2. *GUTTA ROSACEA OENOPOTARUM* seu *BACCHIA*. Format maculas rubras, aliquantum elevatas, & furfuraceas, vini potatoribus est familiaris, & nasum eorum tuberosum reddit. Quandoque brachia, collum & pectus occupat.

Curatio est difficillima, et exigit abstinentiam a vino. Absorbentia, herbæ alcalescentes, aqua selterana, juscula millepedum, viperarum, cancrorum, testudinum, succi antiscorbutici, præsertim fumarix, cum purgantibus adhibeantur.

Externe aqua vegetomineralis cum felle taurino: petrosellinum maceratum, aqua phagædenica tentari potest. Sed cave ne acrimonia repellatur.

3. *GUTTA ROSACEA HYDROPOTARUM*. Plures curavi suadendo, ut vinum bibere incipiant.

4. *GUTTA ROSACEA FEBRILIS*. Si in febribus malignis nasus purpureus, bruneus, nigricans, tumidus, pustulosus evadit, mors instat, ex 20 vix 2 evadunt. *

* De MEYSEREY T. 2. n. 241.

5. *GUTTA ROSACEA PERNIONALIS.*

Rubor chronicus nasi a gelu.

Curatur unguento ad perniones.

6. *GUTTA ROSACEA HERPETICA.* Est pruriens, vesiculosa & furfurascens.

Curatur ut herpes.

7. *GUTTA ROSACEA SYPHILITICA* signa luis venereæ habet. Vide *maculas venereas*.

8. *GUTTA ROSACEA LACTENTIUM.* In lactentibus maculæ rubræ circa genas & labia oriuntur, in cujus centro foramen fuscum & siccum apparet. Hæ maculæ diu permanent, aliquando in crustam lacteam abeunt, at non semper.

Curatio exigit decoctum violæ tricoloris. V. *Crusta lactea*.

9. *GUTTA ROSACEA VARIOLOSA.* Maculæ rubræ in genis post variolas toleratas sæpe per medium annum remanent.

Evanescent suas sponte. Sed citius, si oleum been cuti illinatur. *

S T I G M A.

Est punctum coloris coccinei, in facie vel alia parte.

SPECIES sunt :

1. *STIGMATA NATIVA* incurabilia sunt.

* *Cel. BRUCKMANN* *diff. de nuce Been. Helmst. 1750.*
p. 27. memorabilia hujus rei exempla recenset.

2. *STIGMATA RUBRA*, quæ subinde subito in facie a violenta *tussi* vel *vomitu* oriuntur, sua sponte evanescunt, sic etiam a *scorbuto*, a suppressis *menstruis*, talia rubra stigmata in toto corpore vel in una solummodo parte observantur.

Curatio exigit ut morbus, cujus hæc stigmata symptoma sunt, curetur.

3. *STIGMATA NIGRA* a pulvere pyrio in faciem expulso, exigunt, ut granula pulveris dentiscalpio eximantur.

ERYTHEMA.

Est cutis macula rubra, solitaria, apyreta & topica, non ut erysipelas per totam partem diffusa.

SPECIES sunt:

1. *ERYTHEMA AB IGNE*. Macula rubra, igne inducta, optime curatur, si ardor aqua frigida sopiatur, & dein aqua alba vel unguentum plumbatum applicetur.
2. *ERYTHEMA A GELU*. Est rubor cum levi tumore glabro & splendente, ad mutationem aeris hyeme pruriens. Nasum, digitos manuum & pedum atque calcaneos afficit. Frigus extrahitur nive vel aqua frigida, rubor curatur unguento ad perniones.
3. *ERYTHEMA AB ATTRITU*. Rubedo clunium in equitantibus, rubedo manuum in operariis & pedum in peditibus huc pertinet.

Curatur applicato sevo recenti , butyro cacao aut unguento plumbato.

4. *ERYTHEMA A DECUBITU*. In regione coccygis , & ossis sacri vel Ilii ægrorum , diu decumbentium , observatur. *Curatio* exigit corium molle & pulvinaria excavata , quibus lumbi & femora sustineantur , ne coccyx a le-
do prematur ; rubor loci Aqua Thediana , *
unguento plumbato vel linimento ex albumi-
ne & spiritu vini tegatur. Idem fiat , si sub sa-
natione fracturæ cruris a decubitu erythema in
calcaneo pedis oriatur.

5. *ERYTHEMA AB ICTU INSECTI*. Præ-
sentissimum remedium est applicatio aquæ fri-
gidæ vel petrosellini in aqua macerati.

6. *ERYTHEMA AB APPLICATIS ACRI-
BUS*, ut vesicatorio , synapismo , urtica.

Curatur butyro non salito.

7. *ERYTHEMA VOLATICUM GENA-
RUM* est subitaneus rubor genarum & faciei,
qui brevi iterum evanescit. Observatur in ver-
minosis , hystericis , in verecundia & instante
menstruatione , nec non in lactentibus , ab ira
nutricis.

8. *ERYTHEMA FEBRILE*. Erythema nasi ni-
gricans & pustulosum in febribus malignis
mortis instantis signum est. Vide *Necrosis*.

* Cel. THEDEN *Bemerkungen*. 2. Theil. p. 253.

Erythema circa nares in febris non malignis diarrhæam præſagit.

9. *ERYTHEMA AB INTERTRIGINE. V. intertrigo.*

10. *ERYTHEMA COMPLICATUM CUM ALIO MORBO.* Est rubor, qui tumoribus scirrhis, œdematosis, vulneribus, ulceribus antiquis, fracturisque supervenit.

Curatur aqua vegetominerali. Erythema ab incipiente *spina ventosa* subinde unguento neapolitano discutitur.

M O R B I L L I.

Sunt exanthema febrile, quod maculas parum elevatas, rubras, uniformes, in tenuissimam furfurationem abeuntes, format, atque symptomatum catarrhorum præludium habet.

ERUMPENTES morbilli stigmata rubra, elevata, pulicum morsus æmulantia, exhibent.

De miasmate morbilloso & de *curatione* morbillorum vide *Authores* qui *febrem morbillosam* describunt.

S C A R L A T I N Æ.

Sunt exanthema febrile, quod maculas multo latiores quam morbilli, ruberrimas, irregularis formæ, prurientes, in desquamationem abeuntes, sine præludio catarrhali format.

V. *Authores*, qui de *febre scarlatina* scripserunt.

U R T I C A R I Æ.

Sunt exanthema febrile quod cum levissima febre erumpit atque maculas parum elevatas, rubras, valde prurientes, & ardentes, cum minimis punctis elevatis, qualia a foliis urticæ excitari solent, format.

Illud singulare habent maculæ *urticatæ*, quod in frigido magis emergant, & in calido evanescant. De *curatione* vide Authores, qui *febrem urticatam* describunt.

MACULÆ VENEREÆ.

Sunt maculæ, quæ a *viru venereo* proveniunt.

Sunt maculæ duræ, circulares, rubræ, parum elevatæ cum margine calloso, albido, quæ in lue confirmata in fronte, circa tempora & in thorace efflorescunt.

Circa frontem formant sic dictam *coronam veneream*. *Curantur* interno usu mercurialium & antivenereorum. *Externe* aqua phagædenica aut solutione sublimati lavari debent.

E S S E R Æ.

Sunt maculæ coloris rubri, sed latæ, discretæ, splendentes, glabræ, ardentes, ac prurientes, planæ, *non elevatæ* ut maculæ urticatæ, in manibus & facie ut plurimum *sine febre* erumpentes.

Subinde in calore lætissime efflorescunt, & in frigore se subducunt, subinde, quod mirum est, recte contrarium obvenit.

Curatio exigit lenia purgantia, dein diaphoretica & diluentia dentur.

PSYDRACIÆ.

Sunt maculæ rubræ in latam ac superficialem vesicam quasi elevatæ.

SPECIES sunt:

1. *PSYDRACIÆ SPONTANÆ*, quæ etiam *Porcellana* dicuntur, sunt maculæ coloris rosei, solitariae, pollicaris diametri, in pectore & brachiis, aliisve partibus tectis subito erumpentes & recedentes.

Curatio exigit purgans antiphlogisticum. Evanescent sine suppuratione aut desquammatione, sola resolutione.

2. *PSYDRACIA URTICATA*. Urtica urens, cactus, phaseolus pruriginosus & aliæ plantæ, hanc psydraciam excitant, si manu tangantur.

Cespites vivi applicati cito curant.

3. *PSYDRACIA A PUNCTURA INSECTORUM*, a vespa, culice & aliis insectis tales psydraciæ oriuntur, quæ aquæ frigidæ applicatione optime curantur. V. *Ictus ab insecto*.

RUBEDO CUTIS.

Est rubedo non maculosa sed diffusa per totum corpus vel faciem totam, aliamve partem.

1. *RUBEDO A VERECUNDIA*. Vasa cutanea genarum a pudore dilatantur, ut in inflammatione.

2. *RUBEDO A GELU*. A frigore facies manusque ruberrimæ evadunt, sunt qui hanc rubedinem sæpe per totum tempus vernale non amittunt. *Curatur* unguento ad perniones.

3. *RUBEDO A VERNICE*. Sinenses, qui vernicem ex arbore *Rhus* extrahunt, intra 24 horas universali rubore inficiuntur.

Curatur hic morbus ut universalis inflammatio.

4. *RUBEDO A VENENIS*. Esus baccarum *atropæ* & *squali caniculæ* intensam rubedinem per totum corpus diffusam excitat.

Curatur emetico, dein oxymel vel acetum datur.

5. *RUBEDO A PLETHORA*, si homines plethorici exercitio vel calore vel spirituosius nimium se commovent, in facie & toto fere corpore rubent.

Curantur venæsectione, & antiphlogisticis.

6. *RUBEDO NATIVA*. In India incolæ insularum Philippinarum sunt atrorubri, & Patagones colorem cupri nativum habent. Etiam in nostris regionibus neunati infantes saturate rubent, at paulatim expallescent.

ZONA SEU ZOSTER.

Sunt vesiculæ pisiformes, discretæ, atrorubræ, non raro confluentes, intense prurientes & dolorificæ, quæ instar zonæ seu cinguli ad manus lati-

tudinem pectus vel aliam partem circumdant. *
Cutis simul late rubet, vesiculæ serum purulentum continent & apices vesicularum cito gangrænescunt. Sub umbilico & in regione ischiadica usque ad genua hunc morbum vidi.

Peculiaris acrimonia biliosa subesse videtur. Post magnam iram & large desuper potatam cerevisiam his hunc morbum vidi.

Curatur interne dato sale amaro, & externis fomentis siccis. Pinguia & humida, ut vidi, admodum nocent.

ZONA HERPETICA est herpes, quæ cinguli ad instar genua aut collum circumdat. V. *Herpes*.

MACULA LATA PLATERI.

Est macula rubra e pluribus maculis confluentibus constans, cujus ardor tantum est, ut ægri vivam flammam corpus lambere credant. ** Fere semper pustulis in suppurationem abeuntibus stipatur, & fere nunquam sine prægressa febre calida.

Loca, quæ ignis sacer maxime infestat, sunt potissimum alterutrum latus abdominis vel thoracis, rarius in facie vel collo vel alia parte observatur.

* Aliis hic morbus *zoster*, vel *ignis sancti Antonii* vel *erysipelas pustulosum* vocatur.

** *Ignis sacer*, *Ignis Sancti Antonii*, *Hieropyr* ideo etiam ab aliis authoribus hæc erysipelatis peculiaris species dicitur. Vide D. SPERLICH *dissert. de igne sacro. Buda 1780.*

Ab erysipelate vulgari & bulloso differt suo ingenti ardore, & pustulis suppurantibus, non ut in bulloso, effuso sero exsiccantibus vel in crustas abeuntibus.

Morbus hicce quandoque epidemicus fuit.

Curatio exigit purgantia, ac dein sudorifera antibiliosa vel antiseptica pro ut indoles febris comitis est.

Externe fomentum siccum applicetur.

E C C H Y M O M A.

Est macula livida, plana vel tumida, successu temporis flavescens, & evanescens, a contusione nata.

SPECIES sunt:

1. *ECCHYMOMA VIOLENTUM*, quod ex prægressa contusione, oritur.

Curatur venæsectione & oxycrato spirituofo, aqua Thediana aut fomento resolvente.

2. *ECCHYMOMA A VENÆSECTIONE*.
Altero vel tertio die post venæsectionem sæpe tota interna antibrachii superficies latissima macula livida suffusa invenitur.

Curatur ut prior species.

3. *ECCHYMOMA A DECUBITU*, quod in cadaveribus & in ægrotis diu decumbentibus in dorso & clunibus sæpe observatur.

4. *ECCHYMOMA SPONTANEUM*, quod sine contusione aut scorbuto nascitur. Feminis quibus catamenia suppressa sunt, sæpe supervenit.

Curatio est in omnibus ut in ecchymomate violento.

LIVOR CUTIS.

Est livor non maculosus sed totam partem occupans.

1. *LIVOR A STRANGULATIONE*. Facies nigro livore suffragatur in suspensis fune, in suffocatis, & in neonatis, quibus collum funiculo umbiliculi contortum fuit.

Curatur ut ecchymoma violentum; in infantibus e funiculo umbilicali emittatur sanguis.

2. *LIVOR FEBRILIS*. In paroxysmo frigoris febrilis & etiam a frigore aeris tempore hyemali digiti & unguis livent. Hicce autem livor sua sponte evanescit.

VIBICES.

Sunt striæ longæ, lividæ vel coccineæ, quales a flagellis relinquuntur.

SPECIES vibicum sunt:

1. *VIBEX A FLAGELLO*, curatur ut ecchymoma violentum.
2. *VIBEX SCORBUTICA*, vide *maculas scorbuticas*.
3. *VIBEX FEBRILIS*, in febribus putridis observantur tales striæ, curantur ut petechiæ.
4. *VIBEX A PANARITIO*. Bis vidi striam rubram a digito inflammato in antibrachium usque pergentem, quæ inciso tumore evanuit.

MACULÆ SCORBUTICÆ.

Sunt maculæ lividæ, quæ a *scorbuto* proveniunt.

In cruribus scorbuticorum non solum maculæ *palma-*
res lividæ aut rubentes, sed etiam *parvæ* ut pe-
techia, & *longæ* ut vibices observantur.

Noscuntur ex reliquis signis scorbuti & *curantur* an-
tiscorbuticis.

MACULÆ GANGRÆNOSÆ.

Sunt maculæ, quæ a *gangræna incipiente* oriuntur.

Hæ maculæ sunt lividæ vel nigræ, insensiles, in gan-
græna humida molles, in *gangræna sicca* duræ
sunt. In febribus malignis & putridis sæpe tales
maculæ cum lethali omine observantur.

Curatio exigit antiseptica. Vide *Doctrinam de gan-*
græna.

PETECHIÆ.

Sunt exanthema febrile, quod maculas, pulicum mor-
sibus magnitudine & colore similes, format.

Differunt a veris pulicum morsibus, quod careant
stigmatæ aculei, a pulice infixi, & quod diutius
durent: pulicum enim morsus ultra 24 horas
non persistunt.

Petechiæ febriles a *scorbuticis petechiis* differunt, quod
priors febrem putridam comitem habeant. Sic
etiam

COLOR petechiarum est varius. *Rubræ* petechiæ boni
moris plerumque esse solent, *purpureæ*, *lividæ*

& *nigræ* peioris ominis sunt. Rarissimæ observantur petechiæ ultra cutis libellam *prostantes*.
Ex transfudatione sanguinis putridi ex cute sub epidermidem fieri videntur.
De *curatione* petechiarum vide authores, qui de *febre petechiali* tractant.

M E L A S.

Est morbus, in quo maculæ nigræ, vel fuscæ, cutem deprimentes, sine dolore & pruritu observantur. Subinde profunde ad ossa usque serpit nigredo. *
Est morbus Arabiæ endemius, hinc *peculiare miasma* causam proximam hujus morbi constituere videtur.

Curatur, præmissis purgantibus, antiscorbuticis, sero lactis cum epithymo vel fumaria & veronica, jure viperino, cicuta, antimonio, mercurio, spiritu cochleariæ. *Externe*, synapismi, vesicatoria, balnea sulphurea vel salina, helleborus albus, adhiberi debent.

M E L A S M A.

Est macula livido-atra, quæ tibias potissimum senum absque evidenti causa, & absque scorbuto infestat.

Est morbus diuturnus, qui sæpe in ulcera mali moris degenerat, hinc a *nomate* differt.

Curatio exigit antiseptica interna & externa.

* Vocatur hic morbus etiam vitiligo nigra vel morphæa nigra seu lepra maculosa nigra.

N O M A.

Est macula rubra vel livescens, quæ infantibus vel in gena vel in vulva apud puellas oritur, & intra aliquot dies in sphacelum abit.

Morbus apud infantes quinquennes, potissimum in orphanotrophiis, observatur. Hæc macula, acuta, non dolet, sine febre oritur, ac sine dolore, tumore, & calore in sphacelum buccæ vel vulvæ abit, qui sua sponte sine ulla sanguinis effusione partes vicinas & ipsa ossa cum ingenti fœtore erodit, & intra paucos dies, pulsu, fame atque cæteris functionibus vix mutatis, mortem causat.

Idem malum subinde scorbuticis supervenit, sed incipit cum ulcere albo & exiguo in interna superficie genæ. V. *cancer aquaticus*.

Curatio Nomæ exigit, ut spiritus mercurialis saturatus mediante plumaceolo maculæ gangrænolæ applicetur. *Interne* camphora, cortex, spiritus vitrioli & alia antiseptica dentur.

NIGREDO CUTIS.

Est cutis nigredo non maculosa, sed per faciem, vel aliam partem vel totam corporis superficiem diffusa.

Cutis *nigra* redditur, si humor niger deponitur in cellulas epidermidis. *

* HERMANN *Dissert. de vera natura cuticulæ.*

SPECIES sunt:

1. *NIGREDO NATIVA*, quæ in æthiopibus nigris observatur a depositione mucii nigri malpighiani. Aliquando etiam in europæis regio pubis & areolæ papillarum in mammis nigrescunt.
2. *NIGREDO SCORBUTICA*. Vidi in scorbutico milite totum crus sinistrum adeo nigrum, ut æthiopis esse crus credidisses; curabatur aqua vegetominerali cum spiritu vini camphorato saturata.
3. *NIGREDO MENSTRUALIS*. A suppressis menstruis manus nigras & lividas vidit CEL. SAGAR. Curatur ut ecchymoma.
4. *NIGREDO NECROTICA*, qua partes, necrosi affectæ, conspiciuntur. V. *Necrosis & gangræna*.
5. *NIGREDO SORDIDA*. Aliquando in morbis acutis prospicit cutis, ac si sordes nigrescentes exterius ei insiderent & eam leviter quasi conspurcarent, nullo modo autem hæ nigre sordes se ablui patiuntur.
6. *NIGREDO AB ICTERO NIGRO*. V. apud Authores *icterus niger*.

A L P H O S.

Est lepræ species, in qua maculæ albæ cutem deprimentes nascuntur. *

* Dicitur etiam *vitiligo alba*, seu *morphæa alba*, vel *lepra maculosa alba*. V. Cl. Profess. VOGEL Dissert. de vitiligine.

Duplex datur alphi species:

1. *ALPHUS SIMPLEX*, in quo pili cutanei colore non mutantur, sed maculæ serpunt de parte in partem, & cutem exasperant.

2. *ALPHUS LEUCE*, in quo maculæ albidiores sunt, profunde cutem penetrant, pili cutanei albi evadunt, & si locus affectus fricetur, non rubet, si pungatur, aqua lactea effluit.

CAUSAM alphi peculiare miasma, quod Arabia endemicum est, constituit.

Curatio. Leuce vix amplius curatur. In alphi tentari debent eadem medicamenta, quæ in melas & lepra laudantur.

ALBOR CUTIS.

Est albor per faciem vel totum corpus diffusus.

1. *ALBOR NATIVUS.* In *Africa occidentali*, homines inveniuntur albi. Vocantur *æthiopes albi* seu *lactei*, oculi iridem habent roseam, impatientes sunt lucis, debiles & teneri homines, ex *æthiopibus* nigris, & ex *indis* rubris nascuntur. *

PALLOR CUTIS.

Est cutis præsertim in facie pallor.

* V. Cl. Profess. BLUMENBACH de generis humani varietate nativa. & Illust. HALLERI elementa physiologiæ T. V. p. 24.

1. *PALLOR PATHEMATICUS*. Terror arterias cutaneas constringendo pallorem faciei & totius corporis causat.
2. *PALLOR CHLOROTICUS*, qui simul & virescens est, a chlorotica seu pituitosa cachexia pendet. V. *Chlorosis* apud Authores.
3. *PALLOR A DEFECTU SANGUINIS*, qui hæmorrhagias magnas & omnes copiosas evacuationes humorum sequitur. *Curatur* cardiacis nutrientibus.
4. *PALLOR MORBOSUS*, qui omnes morbos non febriles comitatur.

MACULÆ MATERNÆ.

Sunt maculæ congenitæ seu nobiscum natæ. Vocantur etiam *Nævi materni*.

Nævi generatim in *maculas* & *excrecentias* dividi possunt.

CAUSAM EXCITANTEM credunt esse vehementem matris gravidæ vel cupiditatem vel averfationem. α)

Multæ dantur nævorum varietates respectu coloris, figuræ & indolis; frequentissimæ species sunt:

- α) Obstetricavi illustrem mulierem, cui mus vivus ex arca, quam subito aperiebat, in mammam infiliit, hæc præ terrore animo fere delinguebat atque a tertio graviditatis mense cum tota familia vehementer nævum murinum in infante timuit; prædixi nil timendum esse & præter omnium opinionem, pulchram, omnique nævo carentem enixa est puellam.

1. *NÆVUS LENTICULARIS*. Est macula fusca vel nigra, lentis magnitudine: una vel plures tales maculæ præprimis in facie observantur. *
2. *NÆVUS FLAMMEUS*, qui latam maculam, striatam, quæ vini rubri in faciem quasi effusi colorem habet, refert. **
3. *NÆVUS TUBERCULOSUS*, est macula plus, minus elevata, tuberculis parvis, & non raro ubique pilis obsita. ***
4. *NÆVUS CAVERNOSUS*. Est excrescentia cutanea rubri vel lividi coloris, quæ ex tela cellulosa in substantiam cavernosam mutata, constat, & sanguinem vel succum gelatinosum in cavernulis suis continet. α)

* In mamma cujusdam puellæ maculam nigram, ut æthiopis est color, aurei magnitudinem superantem, vidi.

** Dicitur etiam *morphæa flammea*, germanice *Feuer-mahl*.

*** Nævis pilosis *muris* vel *erucæ* nomen imponunt.

α) Obstetrices & vetulæ his nævis nomen dant rei, cujus similitudinem præ se ferre opinantur. Sic infantes referunt natos, qui *cristam*, *ficum*, *morum*, *rubum idæum*, *farcimen*, & nescio quid secum tulerint. Hi nævi, cum frigore hiemali contrahantur, & calore vernali dilatentur ob humores rarefactione expansos, hinc opinio confirmatur, nævos, qui fructus referunt, tempore florentiæ ejusdem fructus, etiam florere.

5. *NÆVUS MALIGNUS*. Profundas agit radices, & vasa tumida talis nævi tumorem cancroſæ indolis repræſentant, atque cauſticis multum irritatus in verum cancrum exulceratur.

Curatio nævorum. Partes nævo vicinæ emplastro adhæſivo, in quo foramen ad nævi magnitudinem exſciſſum eſt, defendantur, nævo autem ipſi unguentum, ex anatica portione calcis vivæ & ſaponis veneti confectum, applicetur. Sic intra duodecim horas nævus in eſcharam mutatur, quæ ſuccedente ſuppuratione tandem ſecedit. Nævi tuberculoſi facilius, quam maculoſi ſic ſanantur.

Nævi autem magni, quæ vera *ſarcomata* ſunt, etiam ut illa vel ligatura, vel exſciſſione auferri debent.

MACULÆ ARTIFICIALES.

Sunt maculæ, quæ cuti pigmento aliquo inuruntur. Qui morbos fingere volunt, hac arte utuntur. Sic macula *rubra* ſolutione auri, macula *flava* hepate antimonii, vel ſpiritu nitri, macula *nigra* lapide infernali, cuti inuri poteſt, quæ per aliquod ſeptimanas manet, niſi ſolutione alcalina abluitur.

Colores autem *fuco* inductæ ablutione aquoſa noſcuntur.

CUTIS VARIEGATA.

Eſt cutis maculis varii coloris deturpata.

1. *CUTIS VARIEGATA NATIVA*. In tartarorum gente tigridis instar maculati reperiuntur homines. *
2. *CUTIS VARIEGATA MORBOSA*. Visa est ad semel in uno subiecto facies viridis, latus corporis dextrum nigrum, & sinistrum flavum.
3. *CUTIS VARIEGATA A SUGILLATIONE*, quæ cum solvi incipit, pars maculis flavis, & lividis maculata & striata apparet.

CUTIS FUCATA.

Cutis nitida, albitudo cum rosea genarum rubedine, & venis circa tempora cærulescentibus, pulchritudinis exhibet apud Europæos colorem naturalem.

Fœminæ vanæ, suspectæ virtutis, quas natura pulchritudinis colore non decoravit, variis pigmentis hunc sibi inducere tentant.

Fucum *album* sibi inducunt magisterio bismuthi, vel mercurio præcipitato albo, cerussa plumbi, aut remediis cosmeticis. **

* BLUMENBACH *de generis humani varietate nativa*.

** *Cosmetica* vocantur remedia, quæ cuti alborem & nitorem sine fucis seu coloratione inducunt. Hæc virtus quibusdam medicamentis inesse videtur. Dilutissima solutio aquosa sublimati corrosivi, bilis, aqua cosmetica HOMBERGI, aqua cosmetica HARTMANNI, aqua destillata radicis ari &c. huc pertinent. Fumum sulphuris pro dealbandis manibus adhibent.

Fucum rubrum præbet carminum. *Fucum cæruleum*, quo venas temporum sibi pingunt, exhibet succus *helliotropii*.

Fucum nigrum, quo sibi capillos & supercilia nigro colore imbuunt, faciunt solutione lapidis infernalis.

Sed omnes hi fuci, præsertim saturnini & mercuriales, sanitati nocent, & cutem longo usu maculatam relinquunt.

CUTIS UNCTUOSA.

Est cutis splendor unctuosus, ac si esset butyro illita. CAUSA PROXIMA est pororum glandularium, vel qui ad tunicam adiposam pergunt, laxa amplitudo, quæ oleum subcutaneum transsudare sinit.

1. *UNCTUOSITAS VULGARIS*, curatur roborantibus internis, & externa applicatione aquæ frigidæ & liquoris adstringentis.

2. *UNCTUOSITAS ELEPHANTINA*, quæ in elephantiasi observatur, est incurabilis, ut elephantiasis.

CLASSIS II. PUSTULÆ.

Sunt tumores exigui, rubri vel flavi, quorum apex in pus vel crustam purulentam abit.

SEDES materiæ morbosæ vel in glandulis cutaneis, vel in cellulis sub epidermide esse videtur.

SPECIES pustularum sunt:

PUSTULÆ SOLITARIÆ.

Sunt pustulæ exiguæ, quæ tempore æstivo solitariae hinc inde in facie, vel in pectore juvenibus fervidis & puellis erumpunt. Ut plurimum suasponne suppurantur, exsiccantur & evanescent.

Curatio, si eruptio valida est, exigit purgantia antiphlogistica, venæsectionem, & *externe* aqua vegetominerali, vel salita, vel petrosellino in frigida aqua macerato, abluatur facies.

SCABIES.

Pustulas format exiguas, admodum prurientes, quæ scalpendo ruptæ pus effundunt, crustuosæ fiunt; & manus potissimum infestant.

SEDES. Incipiunt hæ pustulæ forma vesicularum rubrarum in digitorum interstitiis, dein manus, genua & cubitos maximam partem afficiunt, inde per totum corpus, sola facie excepta, disperguntur.

CAUSA PROXIMA scabiei peculiare miasma esse videtur, quod glandulas cutaneas occupare amat.

CONTAGIUM SCABIOSUM vel applicatur corpori, vel in eo nascitur. Hinc primaria scabiei divisio est.

1. In *acquisitam*, quæ contactu vel concubitu scabiosi, aut gestatione chirothecarum, indusiorumve scabiosi contrahitur. Hæc in orphanotrophis, nosocomiis, & castris perpetuo præstet, nec non capillamentariis, sartoribus &

textoribus familiaris observatur. Huc etiam *scabies inoculata* refertur.

2. In *spontaneam*, quæ sua sponte ab immunditie, habitatione humida, victu acri, falso, pingui nascitur. Hæc difficilior quam acquisita curatur.
3. In *criticam*, quæ sua sponte tum acutis, tum chronicis morbis supervenit, & illos critice solvit. Huc etiam pertinet *scabies catamenialis*, quæ omni mense loco catameniorum erumpit.

Demum ratione indolis sequentes dantur scabiei *species*:

1. *SCABIES HUMIDA*. Pustulas rubellas, magnas & purulentas format.

Curatur ut inflammatio cutanea, purgantibus, antiphlogisticis.

2. *SCABIES SICCA*, quæ etiam *canina* dicitur, vesiculas minores & rubicundiores, acuminatas, acri sero plenas, refert.

3. *SCABIES HERPETICA*, quæ vesiculas, in albos furfures abeuntes, habet. V. *Herpes*.

Curatio scabiei exigit:

1. *Purgantia mercurialia* sæpius repetita.
2. *Antiscabiosa specifica*, ut extractum enulæ vel fumariz, conservam fumariz, antimonium crudum, flores sulphuris, decoctum bardanæ.*

* *Cel. JASSER* sequentem pulverem omni vespere exhibet ℞. flor. sulph. antimonii crudi, nitri depurati, rad. iridos florentinæ aa gr. vi.

Externe adhibeatur *Balneum* ex aqua fluviatili, *Lotio* totius corporis cum solutione sublimati & sale ammoniaco, cum sapone, vel spec. emollientibus, cum radice hellebori albi, aut *lotio* cum enula. *Unguentum* ex sulphure, vel ex præcipitato albo, vel helleboratum, aut quod efficacissimum deprehensum fuit, *unguentum Jasseri ad scabiem*. *

4. *SCABIES PUTRIDA*. Incipit cum vesiculis crystallinis, admodum ardentibus & prurientibus, quæ sensim inflammantur, atque in ulcera, magnam copiam puris plorantia, abeunt, ac demum magnas crustas virido-cineritias in toto corpore, nec facie excepta, formant. Inter crustas & excoriationes latæ maculæ lividæ & induratae conspiciuntur. Circa vespertas febricula & ingentes capitis dolores cum rigiditate omnium articulationem observantur. Hæc sca-

* Ex vitrioli albi, florum sulphuris, baccarum lauri partibus anaticis & oleo lini vel olivarum q. 5. ad unguentum fluidum. Mane & vespere nucis avellanæ magnitudo palmis manuum infricatur. Dicit celeberrimus author præmissis purgantibus, balneis & pulvere ad scabiem intra 4 septimanas inveteratissimam scabiem sine omni subsequo malo in aliquot centum militibus fuisse sanatam. Vide *Cel. SCHMUCKER vermischte chir. Schriften* 3. B. p. 169.

bies febres putridas sequitur , atque militibus in ultimo bello valde infesta fuit. *

Curatur hæc scabies 1. *purgantibus* eccopropti-
cis omni octiduo datis. 2. *Balneis* ex aqua,
lacte & sapone. 3. *Oleo vitrioli* diluto & in-
terne dato. Guttæ aliquot hujus olei in deco-
cto chamomillarum dari possunt. 4. Ulcera &
crustæ scabiosæ unguento albo camphorato
emolliuntur.

5. *SCABIES TOPICA*, quæ in manu, vel alia
tantum parte erumpit. Eam optime tollit re-
cens herba *boni henerici*, bis de die imposita
quæ magnetis adinstar omnem acrimoniam sca-
biosam ex sanguine extrahit.

6. *SCABIES VENEREA*, quæ in fronte &
aliis locis papulas duras, in apice suppurantes
cum maculis venereis format, curatur mercu-
rialibus ut lues venerea. V. *maculæ venereæ*.

7. *SCABIES VERMINOSA*, ** est scabies,
in qua vermiculi seu acari reperiuntur.

* Hanc scabiei speciem optime descripsit *Celeberrimus*
BALDINGER, cui in morborum castrensiū doctrina
multum debemus, V. Viri hujus doctissimi librum
von den Krankheiten einer Armee.

** In scabie vermes fuisse repertos, nemo, qui LIN-
NÆUM hujus rei testem esse novit, in dubium voca-
bit, dicit *Illustr. MURRAY* in suo egregio opere de
vermibus in lepra obviis. Sed hi vermiculi causa scabiei
esse non videntur, sed solummodo morbus superveniens.
Probabile videtur, quod, antequam scabies in cute erum-

8. *SCABIES RETROGRESSA*. A scabie imprudenter retropulsa, vel frigore, vel adstringentibus reperiussa, multi ac sæpe admodum refractarii oriuntur morbi, ut pertinax capitis dolor, vertigo, melancholia, mania, epilepsia, insultus apoplectici, paralyfes, surditas, amaurosis, catarracta, fistula lachrymalis, & alii oculorum affectus, althma, palpitatio cordis, anxietas, ventriculi & intestinorum dolores, obstructions viscerum, hydrops, atrophia, rhachitis, œdemata membrorum, convulsiones, febres anomalæ, magna ulcera ca-coetha, magni abscessus subaxillares, & aliæ ægritudines.

Curatio scabiei retropulsæ exigit revocationem materiæ scabiosæ ad cutem, vel ejusdem eliminationem e corpore. *Revocatio* sæpe obti-

pat, corruptela quædam humorum semper præcedat, quæ si ad certum gradum pervenit, acaros in caseo vel farina latentes (nam ejusdem speciei sunt) allicit, ut in cute nidum quærant, & rosione sua & excretis liquidis malum reddant pejus. Observamus enim muscas naturæ instinctu eam modo carnem invadere, quæ jam putrescere incipit. Sic vermes, qui in intestinis nidulantur, non alios, quam quibus peculiaris ad eos recipiendos corporis constitutio est, vexant. Vidit *Illustr.* LINNÆUS in lupulo, quod, si ille a larvis phalanæ, radices erodentibus, morbidus factus fuerit, alphides accedant, quæ liquido suo, quod ejiciunt, lupulum penitus perdunt.

netur *vesicatorio*, *emulsione camphorata*, vel *succo betulæ* per mensem quotidie ad libram epoto, *antimonio diaphoretico*, *sulphure*, *fuligine*, *sulphure aurato antimonii*, *potu diaphoretico*, *balneis calidis*, & forti *frictione articulationum*.

His non succedentibus fiat *infectio voluntaria*, dum ægrotus communi lecto, vestibus, indu-siis & laquearibus ad detergendas manus sca-biosi utatur, vel fiat *inoculatio scabiei*, quæ ut inoculatio variolarum peragitur; vel *evacuetur* materia morbosa excitato ulcere, quod *scarificatione*, *setaceo*, *fonticulo*, *inustione*, *vesicatorio*, *exutorio* peragitur.

V A R I O L Æ.

Sunt exanthema febrile, quod pustulas purulentas, contagiosas pro illis, qui eas nondum passi sunt, format.

SPECIES variolarum tum ratione indolis, tum figuræ, tum periculi & decursus valde differunt.

Respectu FIGURÆ, quam variolæ exhibent, habentur:

1. *DISCRETÆ*, si postulæ singulæ toto morbi decursu ab invicem distant.
2. *CORYMBOSÆ*, quæ congeriem pustularum densissimarum, non autem in unam penitus confluentium formant.
3. *COHÆRENTES*, quæ phalanges pustularum, confluentium, solummodo hinc inde sistunt.

4. *CONFLUENTES*, in hac specie pustulæ quasi omnes in toto corpore tempore suppurationis in unam confluunt.
5. *CUSPIDATÆ*, pustulas acuminatas formant.
6. *UMBILICATÆ*, quarum pustulæ foveolam, seu *umbilicum* in summitate habent.
7. *MILIARES*, quæ pustulas pure vel lymphæ plenas, sed semen milii magnitudine æquant, vel paulo majores referunt.
8. *SILIVOSÆ*, quæ vesiculas inanes ut siliquas sistunt, ob materiem morbosam ex pustula reabsorptam & interiora petentem.
9. *BULLATÆ*, quando variolæ aquosæ confluunt, faciunt *bullas* magnas seu vesicæ lymphæ plenas, magnitudine nucis avellanæ, subin majores.

RESPECTU MATERIÆ in variolis contentæ dantur:

1. *VARIOLÆ PURULENTÆ*, quæ pus continent.
2. *VARIOLÆ LYMPHATICÆ* seu *CRYSTALLINÆ*, quæ vesiculas lymphæ crystallina plenas sistunt, siliquosæ, miliares, vel bullatæ esse possunt.
3. *VARIOLÆ VERRUCOSÆ* papulas duras, cuspidatas, verrucis similes, & materiem atheromatofam continent, exhibent.
4. *VARIOLÆ SANGUINÆ* seu *HÆMATEODÆ*, pustulas nigras, sanguinem continent & fundentes, cum fundo nigro granoso sistunt.

5. *VARIOLÆ PETECHIALES*, variolæ quæcunque, si in interstitiis variolarum, vel in ipsis variolis maculæ nigræ apparent, quæ materiem in pustulis contentam rubro colore tingunt, sic appellantur.

RESPECTU PERICULI & DECURSUS habentur:

1. *VARIOLÆ BENIGNÆ*, quæ regulariter decurrunt, nulla mala symptomata habent, & sine periculo sunt, variolæ discretæ, purulentæ, præsertim insitivæ utplurimum sic se habent.
2. *VARIOLÆ MALIGNÆ*, sunt, quæ irregulariter decurrunt, quæ non maculosæ sed papulosæ erumpunt, mala symptomata & vitæ periculum sistunt, ut variolæ confluentes, sanguineæ, petechiales, siliquosæ.
3. *VARIOLÆ REGULARES*, quæ consueta sua stadia regulariter observant.
4. *VARIOLÆ IRREGULARES*, quæ ordinem consuetum decursus non servant.
5. *VARIOLÆ PRÆCURSORES*, aliquando contingit, ut aliquot diebus ante febrem, vel in ipso primo invasionis die, pustula una, vel plures majores in facie, vel collo vel alio loco erumpant, & confestim pus concipiant, ut in duobus meorum infantum vidi. Hæ variolæ faustum morbi eventum præagiunt.
6. *VARIOLÆ INOCULATORUM*, quandoque inoculatores, & illi, qui variolas infantum

tum multum palpitant, unam alteramve variolam in manu sibi contrahunt, licet varicellas jam sint passi.

7. *VARIOLÆ NATURALES*, quæ infectione naturali.

8. *VARIOLÆ INSITIVÆ*, quæ insitione miasmatis variolosi contrahuntur.

9. *VARIOLÆ VERÆ*, quæ semel homines aggre-
diuntur, & intra 14 dies non finiuntur.

10. *VARIOLÆ SPURIÆ*, quas sub nomine *varicellarum* sequenti capitulo describam.

Variolæ veræ, benignæ, regulares *quatuor stadia*: 1 *stadium contagii*, 2 *Eruptionis*, 3 *Suppurationis*, 4 *Exsiccationis*, sistunt.

1. *STADIUM CONTAGII*, quod cephalalgia, lumbagine, nausea, vomituritione, convulsione quandoque & febre noscitur, ab ingressu morbi ad 4 diem circiter durat.

2. *STADIUM ERUPTIONIS*. Quarto morbi die primum in facie & manibus, posthæc in reliquis membris puncta quædam rubra, nunc sparsim, nunc conferta, vel utroque modo usque ad 6 diem paullatim erumpunt, & febris atque reliqua symptomata contagii valde minuuntur, vel penitus remittunt. Sed oris fætor peculiaris, totum conclave adimplens, oritur.

3. *STADIUM SUPPURATIONIS*. A sexto die maculæ cutis pus paullatim concipiunt, & in pustulas lenticularis magnitudinis sensim

elevantur. Ab 8 ad 11 diem pustulæ ulterius ad pisi magnitudinem assurgunt, & depressum hætenus verticem dimittunt. Febris rursus aliquantum increscit, facies nonnihil tumet, fauces dolent, oculi inflammantur, & pustulæ suum halonem rubrum amittunt.

4. *STADIUM EXSICCATIONIS.* Jam per reliquos 4 dies pustulæ maturæ & flavescentes partim siccantur, partim rumpuntur, & in crustas abeunt, quæ vel sponte defluunt, vel ab ipsis ægrotis decerpuntur. Maculæ autem subrubræ in locis delapsarum crustarum subinde per medium annum adhuc remanent, in multis cicatrices seu foveolæ in cute, præsertim faciei, relinquuntur.

CAUSA PROXIMA variolarum est peculiare miasma; morbus utplurimum epidemice grassatur, & qui semel eum est expertus, rarissime altera vice illoprehenditur.

Curatio interna variolarum indicatur a febre, quæ illas comitatur. Vide Practicos Authores, qui de *febre variolosa* scripserunt.

Externa variolarum *remedia* sunt hæc:

1. *Semicupium calidum*, ex aqua & lacte egregie difficilem eruptionem promoveret.
2. Palpebrarum coalitus impeditur *lacte calido*, quo oculi frequenter per diem & noctem elui debent.
3. Pustulæ in cornea *aqua saturnina* impediuntur.

4. Ardor faucium *gargarismate* acido, ut syrupo ribium, & spiritu nitri dulci facto, lenitur.
 5. Pusſulæ maturæ aciculis, vel forficula aperiuntur ad evitandas erosiones cutis & abſorptionem puris. Facta incisione lactis cremor applicetur.
 6. *Crustæ aridæ*, quas variolæ confluentes formare solent, lacte calido emolliri, & dein cerato contegi debent.
 7. *Maculæ*, post variolas residuæ, optime tolluntur oleo been, vel, si aliquoties de die ope penicilli liquore, qui ex aquæ rosarum unciis octo, & spiritus vini camphorati uncia dimidia constat, illinantur.
 8. *Facies* a variolis præſervatur pediluviiis lacteis, atque sinapismis, quæ remedia a die invasionis ad initium suppurationis usque adhiberi debent.
- Fonticuli, vesicatoria nuchæ applicata, fomentationes faciei ex aqua calida vel frigida, aut jure carnis vervecinæ, itemque inunctio ejusdem cum lardo, vel oleo lini, nec non spirituum applicatio, aut rasura capillorum, & hirudinum applicatio merito ab *Illustr. & Expertissimo Professore* V O G E L damnantur.
9. Neque mercurius vivus aut moschus in amuleto corpori applicatus speratum edidit effectum.

10. Optima variolas bonas producendi methodus est inoculatio variolarum, sic ex centenis vix unus moritur, aut multum defædatur.

V A R I C E L L Æ.

Seu *variolæ spuriae* sunt variolæ, quæ ut plurimum sine notabili febre erumpunt, & intra octiduum jam cursum suum absolvunt.

Differunt a variolis veris, quod febrem vix præcedentem habeant, 2 primo die invasionis erumpant, 3 a variolis veris ægrotos non præferant, 4. Sæpius hominem aggrediantur, 5. Intra octiduum vel citius suum cursum absolvant, variolæ enim veræ decursus 14 diebus indiget, 6. raro cicatrices relinquunt, & tunc maxime pro veris imponunt.

SPECIES VARICELLARUM sunt:

1. *VARICELLÆ LYMPHATICÆ*. Sunt pustulæ discretæ, veris simillimæ, jam primo morbi die formantur, humorem continent tenui muco albicanti similem, tertio die siccantur, & ab hoc usque ad septimum decidunt.
2. *VARICELLÆ VERRUCOSÆ* sive *acuminatæ*. Papulas acuminatas, rubras, verrucis simillimas, supra cutem prominentes, in quibus nullus humor est, referunt, & septimo die evanescunt.
3. *VARICELLÆ DURÆ OVALES*. Tubercula formant dura, ovalia, obscure rubentia,

halone rubro cincta, verisque variolis paulo majora sunt. Post duos vel tres dies nonnihil exulcerantur, & tandem cum nigrore exarescunt, denique pallescunt & subsident. Aliquando sub exsiccatione primo erumpentium iterum novæ erumpunt, & sic morbus ad aliquot septimanas protrahi videtur.

4. *VARICELLÆ EMPHYSEMATOSÆ*, quæ vacuæ sunt ut siliquosæ, seu aërem continent.

Variolæ spurix hæud raro epidemice grassantur, veris aliquando succedunt, aliquando præcedunt, rarius contingit, ut inter veras erumpant. Periculi fere semper expertes sunt.

Curatio lenia purgantia & diluentia exigit.

TERMINTHUS.

Pustulæ nigricantes & ardentes, quæ maxime in crucibus fæminarum observantur, *terminthi* vocantur. *

Mox desinunt in crustas, quibus detractis pus emanat.

TERMINTHI NEUNATORUM. Constant ex pustulis majoribus, quæ *lividam aquam* continent, & halonem rubrum habent. Apparent primo ad inguina, inde ad umbilici viciniam, axillas & di-

* Nomen habent a ciceribus sive *terminthis*, quos figura & magnitudine referunt.

gitos, & post tres quatuorve dies exsiccatae decidunt. *

Subinde epidemice occurrunt, periculo fere carent, nisi maximus eorum sit numerus.

Curatio exigit lenia laxantia. Vesiculæ dissecari & dilutissima aqua vulneraria elui, & dein semine lycopodii conspergi possunt.

CLASSIS III. VESICULÆ SEU PHLYCTENÆ.

Sunt tumores exigui, qui pellucidi sunt & non pus ut pustulæ, sed aquam, vel serum saniosum continent, atque rupti vel exsiccantur in crustas, vel excoriantur.

SUDAMINA.

Sunt vesiculæ granis milii magnitudine & forma similes, subito absque febre erumpentes. **

SPECIES sunt:

1. *SUDAMINA ALBA*, quæ sunt vesiculæ concolores cuti, pungentes, & fugaces, quæ æstu aeris aut lecti sæpe excitantur.
2. *SUDAMINA RUBRA*, sunt vesiculæ rubræ granis milii magnitudine similes, quæ juvenes & calidos viros potissimum tempore æstivo agrediuntur.

* Ideo germanis vocantur *Schälblasen*.

** Græcis vocantur *hydroa* vel *boz*.

3. *SUDAMINA BALNEANTIIUM*, sunt vesiculæ miliaribus similes, quæ in diu balneantibus erumpunt.

Curatio exigit victum refrigerantem. *Balneum* ex aqua fluviatili, quod eruptionem ab initio promovet. *Lotionem* ex aqua camphorata.

M I L I A R I A.

Sunt exanthema febrile, quod vesiculas granis milii similes format.

Miliaria continent humorem lymphaticum, qui vel excolor est, vel rubellus, pellucidus vel opacus, hinc vocantur miliaria *alba*, *rubra*, *pellucida*, *opaca*.

SPECIES miliarium sunt:

1. *MILIARIA FEBRILIA*, quæ cum febre erumpunt.
2. *MILIARIA LACTEA*, quæ in puerperis, a lacte sano in cutem deposito, oriuntur, sunt alba, & opaca.
3. *MILIARIA CHRONICA*, quæ sine febre in scorbuto & aliis morbis erumpunt. V. *Sudamina*. De *curatione* miliarium vide authores de febre miliari. *

H Y D A T I S.

Est vesicula sphæroidea, pellucida, indolens, quæ pisi magnitudinem habet.

* V. GESNER *Sammlung von Beobachtungen* 3. Band S. 104.

Magnitudine differt a sudamine. Sæpius solitaria, quam agminata apparet, in tarsis palpebrarum frequentius observatur.

SPECIES sunt:

1. *HYDATIS CUTICULARIS* est epidermidis elevatio in vesiculam aquosam sphæroidem.

Curatur incisione vesiculæ & exsiccatione.

2. *HYDATIS CELLULOSA*, est telæ cellulosæ degeneratio in vesiculas aquosas, id observatur in quibusdam ulceribus & tumoribus. V.

hygroma hydatitosum in doctrina tumorum. *

VESICULÆ CRISTALLINÆ GENITALIUM.

Sunt vesiculæ pellucidæ, aquosæ & dolentes, quæ in phymosi & paraphymosi glandi, vel præputii superficiei internæ insident.

Hydatidibus sunt similes sed dolentes. Sensim rumpuntur & exanitæ corrugantur, aut in ulcera venerea abeunt.

In fæminis autem ex tumidis labiis, nymphis, clitoride ejusque præputio, & ex vagina prodeunt.

Curantur solutione sublimati vel balsamo mercuriali, si interne simul mercurius gummosus adhibeatur.

* *Cel. GRASHUIS tentamen de colica pictorum, cui accedit disquisitio de natura & origine hydatidum.*

U R I T I D E S.

Sunt vesiculæ latæ, rubræ, & admodum prurientes, quæ in apice crepant, & ichorem acrem, fundunt.

Utplurimum crura, rarius brachia afficiunt.


Dividuntur in *nocturnas* & *diurnas*.

1. *URITIS NOCTURNA*, quæ etiam *epinyctis* vocatur, sistit vesiculas atrorubras, noctu potissime acriter prurientes. Differunt a terminthis, quod ichorem & non pus contineant.

2. *URITIS DIURNA*, quæ *hæmeropathos* dicitur, format papulas rubentes, crura obsidentes, quæ extra lectum illico apparent & importune pruriunt, in lecto autem evanescent.

Curatio exigit purgantia & lotiones ex aqua vegetominerali vel appositionem medullæ citri.

CLASSIS IV. BULLÆ.



Sunt magnæ & latæ elevationes epidermidis a cute, quæ vesicas repræsentant magnas.

In hanc classem pertinent.

P H Y M A.

Est bulla pure plena, quæ utplurimum solitaria hinc inde oritur.

Furunculo est similis, sed planior, mollior & illico suppurans.

Nascitur a depositione puris intra cutem & epidermidem. In pueris & in scabiosis has purulentas bullas frequenter vidi. Nullibi frequentius quam in apicibus digitorum sub nomine *panaritii bullofi* occurrunt.

Curatur incisione, & elutione cum aqua vulneraria diluta.

BULLA SOLITARIA.

Est vesica magna, humorem aquosum continens, quæ ut plurimum solitaria apparet.

SPECIES bullarum sunt:

1. *BULLA VESICATORIA*, quæ emplastro vesicatorio excitata fuit. Incidenda est, ut aqua glutinosa effluat, sed epidermis non detrahatur. Alias dolentissima fit excoariatio cutis. Emplastro diachilon simplici effluxus feri ad aliquot dies conservari, emplastro albo camphorato excoariatio sanari potest.
2. *BULLA EX AMBUSTIONE*, seu ab affusa aqua fervida. Incisa vesica applicetur unguentum album.
3. *BULLA A FRIGORE*. Incisa vesica applicetur unguentum ad perniones.
4. *BULLÆ GANGRÆNOSÆ*, quæ in partibus gangræna humida affectis cernuntur, & aqua putrida cadaverosi odoris repletæ sunt. Antisepticiis ut gangræna curantur.
5. *BULLA PEDICULARIS*. V. *Malis pedicularis*.

6. *BULLA VARIOLOSA*. V. *Variolas bullatas*.

7. *BULLA ARABUM* est bulla sua sponte orta, in diu durantem at exiguam exco-
riationem cutaneam, cutem sine dolore corrodentem
abiens. Folia solani nigri contusa per triduum
applicata certissimum sunt remedium. *

8. *BULLA DOLENTISSIMA* est bulla sua
sponte excitata, in dolentissimum, at exiguum
& diu durans ulcusculum cutaneum abit. **
Tentetur applicatio contusorum foliorum sola-
ni nigri.

P E M P H Y G U S.

Vesicæ ichorosæ, quæ nucis avellanæ magnitudinem
habent, & ut plurimum in variis partibus erum-
punt, sic vocantur.

SPECIES sunt:

1. *PEMPHYGUS FEBRILIS*, qui cum fe-
bre putrida erumpit. Vesicæ per plures dies
manent, tandem rumpuntur & sero ichoroso
effuso in maculas atrorubas, crusta nigrican-
te circumdatas, abeunt. Subinde hæ vesicæ
gangrænescent.

Curatio exigit primis viis evacuatis antiseptica
& acetum bezoardicum.

2. *PEMPHYGUS APYRETUS*. Hicce mor-
bus in pauperibus sordide & malo victu viven-

* *Cel. FORSKAL desc. plant. c. 2. p. 46.*

** *Ill. LORRY tract. de morb. cutan. p. 424.*

tibus sine notabili febre subinde cernitur. Acetum camphoratum prodest.

3. *PEMPHYGUS A TACTU COLUBRI BICEPHALI*, qui, si vivus vel mortuus tangitur, apud brasilienses excitat vesicas magnas ichorosas, quæ tribus mensibus durare solent.

4. *PEMPHYGUS CRURUM*. Pinguibus, & qui ulcera inveterata in cruribus habent, atque sub sanatione fracturæ cruris sæpe multæ & magnæ vesicæ aquosæ oriuntur in cruribus. *Curatio* exigit incisionem vesicarum & elutionem cum aqua vulneraria diluta.

CLASSIS V. PAPULÆ.



Sunt tumores exigui sed duri, qui vel resolvuntur vel ex apice quid humidi ejiciunt, & dein desquamantur.

Differunt a *pustulis*, quod non in suppurationem abeant, a *vesiculis* quod non sint aquosæ; sedere videntur in glandulis cutaneis.

SPECIES papularum sunt.

VARI seu JONTHI.

Sunt tubercula rubra, dura & exigua, quæ fere tantum in facie hinc inde oriuntur.

Diu permanere solent, nec dolent, nec pruriunt, nec in suppurationem, ut pustulæ faciei solent, abeunt.

Juvenibus victu crasso utentibus, & spermaticis sunt familiares, circa adolescentiam evanescere solent.

Curatio exigit purgantia salina & decocta herbacea resolventia.

Externe lotio faciei cum aqua salita conducit. Matrimonium varos curat.

GRUTUM five MILIUM.

Est tuberculum faciei albissimum & durissimum, sed admodum exiguum, quod magnitudinem, colorem & duritiem gruti seu milii refert.

Compressione cutis totum tuberculum, quod statim sub epidermide sedem habere videtur, exprimi potest.

Differt grutum ab herpete miliari, quod hic agmen talium papularum referat, grutum autem papulas solitarias.

Causa videtur esse materia atheromatosa in cutem deposita. *

Curatio exigit expressionem gruti ex cute.

HERPES seu SERPIGO.

Est papularum chronicarum ichoroso-squamosarum semper ulterius serpentium agmen. **

* Vulgi præjudicium est, grutum cum jure comestum per cutem iterum efflorescere.

** D. PITNER *diff. de herpcte. Budæ. 1780.*

SPECIES herpetis sunt:

1. *HERPES SIMPLEX*, noscitur papulis rubris, pruriginosis, fursuraceis in cute non multum serpentibus, nec eam profunde exedentibus.
2. *HERPES EXEDENS* seu *ferus* seu *esthiomēnos*, est herpes qui cutem simul profunde exedit, hinc hic herpes vel simpliciter *ulcerosus*, vel si ulceris labia retorrida & dura valde sunt, *cancrosus* est, qualis sæpe in facie observatur.
3. *HERPES MILIARIS*, est agmen papularum, quarum apici rupto inhæret mollecula subrotunda, flavescens, grano milii similis, unde nomen.
4. *HERPES PUSTULOSUS*, est herpes cum pustulis vel vesiculis complicatus.
5. *HERPES SYPHILITICUS*, est herpes, qui a miasmate venereo excitatur, auribus & capitatæ capitis parti insidere solet, noscitur symptomatibus venereis, & curatur mercurialibus externis & internis.
6. *HERPES SPURIUS*, qui a causa externa citra acrimoniam internam oritur ut:
 - a. *Herpes periscelis* est herpes, qui poplitem, ubi zona vinciri solet, infestat, vocatur etiam *zona herpetica*, & a zonæ vinctura oriri solet. Curatur zona remota.
 - b. *Herpes collaris* est herpes, qui collum in forma zonæ circumdat. Collum Ecclesiasticorum,

qui collare acri tinctura vel smalta cærulefcente coloratum gerunt, afficit.

γ. *Herpes cerdonum*, qui a sorditie, qua pedes cerdonum perpetuo alluuntur oritur.

δ. *Herpes a tactu Toxicodendri*.

CAUSA MATERIALIS herpetis est peculiaris acrimonia biliosa chronica in glandulas cutaneas deposita.

CAUSÆ REMOTÆ sunt. Vitium in hepate, ingesta acria præsertim piperata, suppressa evacuatio sanguinis, vel perspirationis, cachexia varia, præsertim scorbutica & venerea, materia febrilis, regio palludosa depressa, labes hæreditaria, contagium.

PROGNOSIS. Herpes quandoque criticus est. *Exedens* in cancrum nervosum quandoque abit. *Retro-pulsus* pessimos quandoque producit morbos: inflammationem pectoris, phthisin, tumorem cancroidem &c.

Curatio requirit purgantia & depurantia sanguinis serum. Mercurius vivus cum sulphure aurato præprimis se commendat. * In herpete exedente acidum vitrioli interne & externe adhibitum, esus pomorum acidorum profuit. ** Fumaria, sarsaparilla, dulcamara, jus viperæ, antimonialia, cicuta, spiritus salis acidus, mercurius gummosus,

* SCHMUCKER *vermischte chirurg. Schriften*. S. 63. B. I.

** *Collectanea Societatis medicæ Havniensis* T. II. p. 1.

dulcis, sublimatus, aquæ martiales acidulæ, cortex peruvianus cum affeclis mixtus.

Externe oleum tartari per deliquium, aut unguentum rosaceum cum sulphure, mercurio præcipitato albo, vel floribus zinci, aut benzoës laudatur. Nec non radix lapati in aceto macerata, thermæ sulphuræ, aqua marina, aqua vegeto mineralis cum spiritu vitrioli, balneum e scoriis metallorum, solutio ex vitriolo albo, sale communi, sulphure, alumine. Aqua stillatitia e succo pomorum borsdorfensium. Folia boni henrici, oleum palmæ. Creta cum lactis cremore, plum-bata, mercurialia præsertim solutio sublimati, fonticulus, caustica, lavatorium ex radice hellebori albi & his medicamentis non sufficientibus, emplastrum vesicatorium super parte herpetica applicatum, efficacissima herpetis remedia deprehendi. *

CUTIS ANSERINA.

Cutis subito & ubique innumeris tuberculis, minimis, pallidis, repletur, qualia in cute anserum observantur.

CAUSA PROXIMA est contractio textus fibrosi cutanei, quæ papillas cutaneas protrudit.

Hinc a frigore ad corpus calefactum admissio, a terrore, a spasmo cutaneo febris intermittens, & etiam post mortem in cadavere observatur.

* BLOCHS, *medizinische Bemerkungen* S. 97.

Curatio. Est morbus fugax , calore brevi & sua sponte evanescens.

T U B E R C U L U M.

Est tumor induratus, subcutaneus, cuti concolor, papula major, non tamen adeo magnus, ut ad tumores magnos referri potius possit.

SPECIES tuberculorum sunt :

1. *TUBERCULUM SCIRRHOsum*, quod induratio seu scirrhus glandulæ subcutaneæ est, sed benignus, indolens, & cuti concolor. Cancer mammarum sæpe a parvo tali tuberculo, per multos sæpe annos quiete hærente, incipit, quod cessantibus menstruis, aut irritatione externa sæpe in magnum carcinoma mutatur.
2. *TUBERCULUM CANCROsum*, quod etiam *noli me tangere* vocatur, est parvum tuberculum in facie, rubrolividum, quod per multos annos quietum manet, si vero medicamentis multum irritatur, dolere incipit & in pessimum cancrum nerveum faciei abit.
3. *TUBERCULUM CISTICUM*, est parvus tumor subcutaneus, atheromatofus vel sevosus, qui sæpe per totam vitam vel manet, vel in atheroma abit.
4. *TUBERCULUM SCROPHULOSUM*. Scrophulæ colli cum parvis talibus tuberculis, quæ circa venam jugularem externam rosarii adinstar descendunt, incipiunt.

5. *TUBERCULUM LEPROSUM*. Format lepra tubercula squammosa & crustosa in toto corpore & facie. V. *lepra*.

6. *TUBERCULUM SARCOTICUM*. Mollia, rubra & indolentia talia tubercula sæpe magno numero in naso propullulant.

7. *TUBERCULUM HYDATITOSUM*. Hydatides subcutaneæ, in scroto vel sub mamma nascentes, globulos rotundos & durissimos referunt.

8. *TUBERCULA PANNOICA*, quæ ab Hungaris *Tsömör* vocantur; languore, & nausea prægressa oriuntur tubercula, quæ tactu manifestantur, circa tempora, in dorso, nucha, brachiis, præsertim in collo & carpo manuum.

Curantur laxantibus, & dein datis diaphoreticis.

Externe convenit frictio tuberculorum cum allio & aceto vini. *

Curatio. Tubercula juxta indolem tumoris, quem referunt, curari debent. Vide *Doctrinam de tumoribus*.

PHYGETHLON.

Est tuberculum rubrum & dolens, quod varo majus, furunculo minus, & phymate durius est.

Sæpe circa anum tale tuberculum oritur, quod male tractatum in fistulam ani abit.

* BATY *Specimen morborum Hungaris endemiorum*.

Curatio exigit purgantia & *externe* aquam vegetomineralem.

L E P R A.

Est morbus in quo cutis præsertim faciei rugosa, & aspera evadit, atque tuberibus magnis rubro-lividis & rimosis deformatur, cum extremorum artuum insensilitate & voce rauca nasali. *

Signa. Incipit morbus cum una rarius pluribus maculis minimis: morbus incipiens ex cutis insensilitate & maculis rubro-pallidis, acus puncturam vix superantibus, quæ ægre a lentigine distinguuntur, quod tamen ope acus adhibitæ, quæ infixæ nullum dolorem excitat, & animadversione, an increseat, fieri potest, noscitur.

Hæ maculæ sine omni inflammatione & elevatione sed potius cum depressione paulatim dilatantur.

Simul cum maculis auricularum lobi intumescunt & indurantur, atque in toto ambitu subinde tuberculis cinguntur. Deinde nares, labia oris & universa facies turgescunt & rubore quodam quasi cinnabarino inficiuntur, progressu temporis ad cæruleum vergente, & in vetustiori morbo lividior evadente. Cutis præterea adest insensilis, & in rugas obdurescentes corrugatur.

Excreta sana sunt, urina tamen pallidula, muriam hæc cum olet, citoque putrescit. Sic morbus quandoque sine notabili incremento per X vel XX an-

* *Cel. SCHILLING, de lepra. Lugd. Batav. 1778.*

nos subsistit. Si vero non bona adhibeatur diæta, tunc

Maculæ leprosæ a facie per universum corpus ad plantas pedum usque erumpunt, atque in tubera, habitum corporis mirifice deformantia, surgunt. Maxime sub unguibus nascuntur vesiculæ, apices digitorum crassescunt & sensum amittunt, serpit e prima phalange malum in alteram citra dolorem, atque ossicula absque dolore delabuntur.

Interdum universum corporis integumentum induratur & ob transpirationem penitus suppressam intumescit in leucophlegmatiam. Accedunt ulcera anodyna, quæ densis crustis brevi labentibus & renascentibus obteguntur. Hæc ulcera interdum, quum cutis in toto maculæ ambitu consumpta esset, sine ulla medela consolidantur, dum paullo post aliæ maculæ prodeunt, quæ pariter exulcerantur. Quidquid e corpore humoris transpirat, intolerabiliter foetet. Pertinax adest obstipatio, excrementa sunt nigra, valde sicca. Urina rufa, uroscopiis tenaciter adhærens. Sitis perpetua: lingua semper sicca, interdum nigris crustis tecta, & hinc inde quasi rimosa. Sanguis admodum tenuis, exiguam feri copiam dimittit, & ex vena missus putridum olet, cruoris globuli sunt albi. Stimulus ad venerem assiduus & cum genitalium pruritu ad mortem usque non coërcibilis.

CAUSA PROXIMA est miasma seu acrimonia sui generis, lentam putredinem humorum & languorem cutis & extremorum inducens. Morbus inter Arabes,

Aegyptios, Abyssiniam & Americam meridionalem endemius, & frequens est. Contrahitur a parentibus & per ubera, coitum, habitum, & sudorem subiecti morbofi: etiam domicilia infecta aliis sunt contagiosa.

CAUSÆ EXCITANTES esse censentur esus carniū semi-putridarum: victus piscium & porcorum pinguium leproforum: potus aquæ multis piscibus putrescentibus repletæ: tempestas constans calida, sicca vel in summo gradu humida. Terror, veneris abusus, refrigeratio contagium jam receptum cito & sæpe intra unam noctem evoluunt.

Prognosis. Lepra est vera crisis virus leprosi, hinc toleranda. Recens curabilis, adulta incurabilis est. *

Curatio exigit, ut causæ excitantes & causæ morbum adaugentes fugentur.

Crisis per cutim promovenda ope balneorum tepidorum, bis in septimana ad 15 horæ minuta usurpatorum, dein quotidie bis adhibitorum, cum emollientibus & leniter detergentibus: ut hepate sulphuris in aqua soluto, exercitatione & vino promotis per trimestre adhibitis.

Ulceræ tinctura aloes, myrrhæ & succini deligentur.

Calli cutis unguento de althea & enulæ emolliantur.

* Facilius sanatur lepra, quæ totum corpus, quam quæ solum partem afficit. Acida & mercurialia leprosis noxia sunt.

Si morbus fugatus, corpus roborandum interne & externe per suffimigia. *Antileprosa* interne danda In sanatis maculæ distinctæ non amplius incrementum a lepra remanent.

Curatio interna tentari potest ledo palustri*, æthiopi minerali, antimonio, croco martis, lacte, purgantibus.

Externe adhibeantur solutio salis ammoniaci, balnea sulphurea, martialia, helleborata, & inungantur crustæ butyro, vel unguento ad lepram.**

LEPRA ASTURIENSIS, est lepra Asturiensibus endemia, in qua crustæ æstivo tempore delabuntur & cicatrices coloris rosei, infra cutis libellam depressas, lucidas & per vitam durantes reliquunt. Malum insanabile censetur.

* *Schwedische Abh.* 35. vol. *Cel.* ODHÉLINS casum refert ancillæ lepra nodulosa affectæ, in qua ex infuso ledi palustris seu roris marini sylvestris nodi sensim resoluti fuerunt.

** *Florentiæ* in nosocomio S. EUSEBII leprosi omni altero die inunguntur & sic sine alio fere remedio curantur, sequenti unguento: R. Lardi & butyri majalis aa ℥iiss. Terebinthinæ ℥xiv. ceræ albæ ℥vj. liquefiant lento igne; dein adde, mercurii præcipitati rubri ℥j. Salis communis sicci & merc. sublimati corrosivi aa ℥ij. Succum limoniorum & spiritum aceti aa q. s. pro unguento formando. V. GALEOTI *Dissertatione sopra les malattie, che si curano nel regio spedale di S. EUSEBIO con i rimedi soliti usarsi nel medesimo.* FIRENZE 1771.

Demum multi alii morbi cutanei, qui pertinaces sunt & totum fere corpus occupant, nomine lepræ ab Authoribus denotantur, ut

1. *LEPRA HERPETICA*, est herpes crustaceus in toto corpore. V. *Herpes*.
2. *LEPRA SCABIOSA* est scabies putrida, quæ etiam totum corpus occupat. V. *Scabies putrida*.
3. *LEPRA FUNGIFERA*, quæ excrescentias fungosas format. V. *Frambæsia*.
4. *LEPRA SQAMMOSA*, quæ ubique squammas producit. V. *Ichtyosis & impetigo*.
5. *LEPRA MACULOSA*, seu *VITILIGO* quæ maculis depressis, albis vel nigricantibus cutem defædat. V. *Alphos & Melas*.
6. *LEPRA ELEPHANTIACA* seu *ARABICA*. V. *Elephantiasis*.
7. *LEPRA SETOSA*, vide *hystriicias*.
8. *LEPRA TOPICA*, quæ unam solummodo partem afficit.

E L E P H A N T I A S I S.

Est lepra, quæ potissimum pedes afficit.*

Signa. In pede adfecto phalanges ossiculorum paulatim intumescunt, cutim & carnes mirum in modum expandunt, crassescunt digiti, tandemque colliquescent ceræ adinstar, unde a levissima causa hæmorrhagia, sponte & cito iterum cessans

* *Cel. SCHILLING de lepra. Lugd. Bat. 1778.*

Serpit malum ad femur usque, contracturam articulorum efficiens. Simul panniculus adiposus & cutis in plicas & rugas ita sensim se componunt, ut pedis elephantini formam omnino referat. Demum cruribus deformatis & manuum digiti circa articulos tument, & successive soluti cadunt, inde absque dolore ulcera primo faciem & dein carnosas partes cum intolerabili fœtore depascuntur.

Anatome in amputato ejusmodi crure nulla periostii externi & medullæ ossium vestigia, nec ullas cavitates ossium deprehendit. Nulla ferme vasa vel sanguifera vel lymphatica in partibus internis observantur, eaque in corrugata cute sunt varicosa & fere inania, ambo cruris ossa & ossa pedum quasi in unum confluerunt, & arteria interossea est deleta.

Prognosis. Morbus incipiens subinde curatur, morbus autem inveteratus, insanabilis est.

Curatio morbi incipientis tentatur balneis sulphureis, quibus cicuta, helleborus albus & globuli martiales adduntur. Dein plurima loca recentibus foliis boni Henrici obtegantur, etiam vesicatoria, & lotio partium cum spiritu vini aquoso, sale tartari & spiritu salis ammoniaci in hunc finem laudantur.

Interne purgantia, aquæ martiales, juscula viperina, fumaria, sarsaparilla, saponaria, chærophyllum, agrimonia, radix dulcamaræ, lapathum acutum, cortex Winteranus, cortex radicis saffrafras & pe-

ruvianus * laudantur, nec non antimonium crudum, atque tinctura cantharidum. **

CLASSIS VI. CRUSTÆ.



Sunt cuticulæ mutationes in corpus siccum, emortuum, crassiusculum, a cute deciduum vel ei adhærens.

Nascuntur ex solidis & fluidis cum glutine morbofo exsiccatis.

SPECIES crustarum sunt :

C R U S T A.

Est corpus emortuum, siccum, fusco nigrum, a cute sine suppuratione deciduum, solam epidermidem afficiens.

SPECIES CRUSTARUM sunt:

1. *CRUSTA ULCERUM*, ex ulcere male sanato sæpe gluten exsudat, quod locum ulceris tali crusta obtegit.
2. *CRUSTA SCABIOSA*, in scabie simplici tenues, & glabræ, in putrida autem crassæ oriuntur tales crustæ, quæ virides atque pillosæ sunt, sua sponte decidunt.
3. *CRUSTA VARIOLOSA*. Exsiccata variolæ in crustas abeunt, vel sua sponte deciduas, vel ab ægrotis decerpendas.

* *Artzneykundige Abhandlungen von dem Collegio der Aerzte in London.* 1. B. 18. S.

** MURRAY *de vermibus in lepra obvijs, juncta leprosi historia.*

4. *CRUSTA CANCROSA*, quæ cancrum nervosum subinde ad digiti crassitiem comitatur. Unguento mercuriali emollitur.
5. *CRUSTÆ LEPROSÆ*. V. *Lepra*.
Curatio crustarum exigit ut crustæ lacte emolliantur, & dein deglubantur.

ESCHARA.

Est corpus subhumidum, fuscum vel nigrum, quod ipsam cutem afficit, & hinc ab ea sine suppuratione non separandum.

Ignis, fulmen, lapis causticus, carbunculus & gangræna ficca cutem adeo in escharam mutare valent.

Curatio exigit pingua & emollientia, subinde scarificationem, ut ope suppurationis natura facilius escharam a partibus sanis separare possit.

ACHORES seu SCABIES CAPITIS.

Format ulcera crustosa, humida, in capillata capitis parte. *

SPECIES hujus scabiei sunt:

- I. *SCABIES CAPITIS SIMPLEX*. Incipit densissimis granulis ac si ex cute grana milii prominerent, hæc granula rumpuntur, & exsudans gluten in toto capillitio ulcera crustosa format; crustæ hæc sunt ubique foraminosæ, ac si tineis essent erosæ. Hinc hæc scabies ca-

* D. MIHR *diff. de achoribus*. Budæ 1783.

pitis etiam *tinea benigna* dicitur. Humiditate scabies capitis a tinea vera differt.

2. *SCABIES CAPITIS FAVOSA*. Format ulcera, quæ ob foramella ampliora alveolis favi, melle albido turgidis, similia sunt. Incipit vesiculis purulentis, in capillitio sine prævia inflammatione ortis, quæ sponte vel levi digitorum pressione crepant, & pulvem albidoflavescentem fundunt, atque exsiccatae squamas gryseas relinquunt.

3. *SCABIES CAPITIS FICOSA*. Si ulcera capillitii in foveolis suis purulentis granula flava, qualia in ficu discissa semina sunt, habent, *ficosa* vocatur scabies.

4. *SCABIES CAPITIS LUPINA*. Exhibet ulcera sicca, quæ marginata sunt squammis callosis, seu lupiorum aut cicerum instar capitata & incrassata.

CAUSA PROXIMA est mucus animalis acescens ac rancidulus. *

CAUSÆ REMOTÆ sunt ætas tenera præsertim ablactata, rarius ætas adulta. Diæta prava, labes hæreditaria, metastasis humoris retenti, menstruatio suppressa.

PROGNOSIS. Scabies capitis est critica evacuatio humoris acrimoniosi, qui per glandulas capillitii excernitur. Hinc est morbus infantibus salubris,

* *Cel. LORRY de m. cut. p. 439.*

sed neglectus & diu durans cranii ossa inficit, & tunc difficillime sanatur.

Scabies hæcce pruritu, dolore & ingenti fœtore infantes molestat, pallorem faciei, noctes insomnes, maciem quandoque cum febre hectica causat, & ob pectinationis vel defectum, vel difficultatem ingens pediculorum copia nascitur. Scabiei excretio frigore vel exsiccantibus *suppressa* pessimos oculorum, cerebri aut pulmonum morbos procreat, ut febrem, cæcitatem, ophthalmiam, epilepsiam, convulsionem, glandularum colli intumescencias, tussim, phthisim, anasarcam, hydrophem cerebri, apoplexiam.

Curatio exigit 1. *tonsuram* capillitii, & *pectinationem* cum scopula setacea.

2. *Lotionem* capillitii cum aqua furfurum vel hordei cum melle, vel cataplasma ex farina avenæ cum aqua & butyro, folia boni Henrici vel brassicæ crispæ viridis capiti applicata, nasturtii succum cum pinguedine anseris, camphoram lacte solutam.

3. *Purgantia* sæpius repetita.

4. *Decocta purificantia* ex bardana vel lapatho, & fumaria. Aquas acidulas martiales, cort. peruvii.

5. *Caput* semper mitris & linteis *calidum* servetur, *Diæta* observetur salubris.

Scabies capitis *retropulsa* exigit sinapismum, vel vesicatorium abrafo capiti imponendum, ut revo-

cetur scabies, vel denique novam infectionem ope applicatæ mitræ scabiosæ.

CRUSTA CAPITIS NEUNATORUM.

Est crusta sicca, & crassa, quæ in infantibus brevi post partum verticem & sinciput tegere, & sæpe medium per annum durare solet.

Curatio. Præter purificationem cum scopula setacea nihil tentetur, nam suo tempore sponte evanescit.

CRUSTA LACTEA.

Est eruptio crustarum in genis vel alio faciei loco.

- I. *CRUSTA LACTEA INFANTUM.* * Erumpunt in genis pustulæ latæ vel acutæ, humore limpidi, glutinoso plenæ, quibus ruptis liquor effluit glutinosus, tenax, cuti adhærens, qui crustam flavo-rubram efficit. Crusta ipsa sæpe finditur, eque fissuris humor glutinosus, crustæ crassitiem & duritiem augens, effunditur. Cutis ipsa adfecta dura redditur & partes subjectæ intumescunt. Tumidæ simul sunt glandulæ jugulares, raro parotides. Aliquando crustæ ejusmodi serpunt ad auriculas, aut e mento erumpunt, imo quandoque frontem occupant & totam faciem, exceptis palpebris, larva te-

* *Cel. STRACK de crusta lactea infantum ejusdemque specifico remedio diss. Francof. ad Mcenum. 1779.*

gunt. Quandoque ophthalmia vel otorrhæa simul contingit. Quandoque ad reliquum corpus, ut collum, pectus, abdomen, nates & extremitates a facie transeunt.

Ætas. Infantibus lactentibus magis quam ablactatis, semestribus magis, quam qui dentibus jam gaudent, familiaris est morbus. Interdum vero etiam serius incipit morbus atque ultra dentium eruptionem perstat, interdum recurrit.

CAUSA PROXIMA acris mucus metastatice ad faciem depositus esse videtur. Non videtur morbus esse hæreditarius, neque aliis infantibus contagiosus. ** Infantes enim reliqui innocue cum crustosis in eodem lecto dormivisse fuere visi, atque unus e pluribus infantibus ab eadem matre lactatis morbo solum corripitur.

Exitus. Diuturnus est morbus, qui infantibus quietem & alacritatem detrahit. Ingentem quandoque excitat pruritus, unde infantum fletus, pervigilium, pavor in somno, & alvus tarda: solvitur morbus per urinam tetri odoris, qualem urina fellis spargit.

Nihil mali a morbo remansisse patet, si facies post sanationem mollis.

Sustinuisse hominem v. g. nutricem in sua infantia hunc morbum conjicimus, si cutis faciei solito

* Anonimi alicujus authoris *Ausführliche Abhandlung von Sägesprüngen einer bekannten Kinderkrankheit. Nürnberg. 1779.*

magis glabra, & exesa circa genas tenui lanugine polita & splendens est, reliqua vero faciei cutis albida magis est, si erubescens non roseo sed coccineo seu scarlatinoso rubore suffunditur, sed per latas maculas interposita albedine distinguitur.

Curatio exigit, ut purgatis primis viis infanti quotidie lac, in quo pugillus unus jaceat seu violæ tricoloris recentis incoquatur, detur. Sic intra 3 vel 4 septimanas hic morbus tuto curatur.

Alii angelicam, levisticum, imperatoriam, arum in decocto laudant. Alii fuliginem ad gr. iv in syrupo cichorei.*

Externe evitentur medicamenta plumbata, exsiccantia & oleosa. Facies cum decocto quodam in quo bilis bubula solvitur quotidie lavetur. Cremor lactis acidulus crustis illinitus pulchre sopit pruritum. Nutrix bonam servet diætam & iisdem ut infans utatur medicamentis.

Nihil mali a morbo remansisse patet, si facies post delapsum crustarum mollis nec supra pinguedinem tumida, cutis tenuis, non dura vel coriacea aut squammulis aspera & urina sana.

2. *CRUSTA LACTEA INFANTUM LARVATA.* Ante crustæ lacteæ eruptionem ophthalmia, obstructio glandularum, lippitudo, otorrhæa, tabes infantes afficit.

* L. c. p. 55.

Nisi quid crustosi in facie se ostendat, lactentis facies crassior est, quam a sola pinguedine expectes, buccæ tumidæ, rotundæ. Cutis genarum profunde rubra, cutis subiecta dura in pliculas trahi se non finit, caticula digito explorata aspera & elevatis minimis squammulis hirta. Friccio partis ab infante tentatur, urina fœtida quandoque.

Non satis egressis papulis efficit materia crustæ lactææ latens infarctum glandularum meseraicarum, unde tympanites, bulimia, tabes. Repressis autem papulis crustosis morbi glandularum, tussis, asthma, tabes sæpe oriuntur.

Curatio exigit, ut purgatis primis viis decoctum violæ tricoloris vel pulvis ejusdem detur.

3. *CRUSTA LACTEA PUERPERARUM* *

In puerperis quandoque a metastasi lactea in genis, mento, palpebris, imo & oculo pustulæ citra erysipelas, pure lacteo turgentes, summe prurientes, quæ horridæ visui, ruborem cuti conciliant, imo crustæ cute magis depressæ apparent cum odore gravi fœtido. Hæ crustæ non raro abeunt & redeunt, siphilidem simulant, at a dato mercurio summa oriuntur mala.

Curatio. Salus a cura metastasibus congrua, ut a purgantibus, decocto spiritum dulcamaræ & arcano duplicato.

* *Cel. LORRY de morbis cutaneis p. 283.*



T I N E A.

Noscitur crustis viridescentibus, siccis & pertinacibus, quæ capillitium atque marginem frontalem occupant. *

Tineæ species sunt:

1. *TINEA VERA* seu *CRUSTOSA* format crustas viridescentes, cineritias vel nigricantes. Peculiare miasma hujus morbi causa esse videtur.

Curatio exigit

1. *purgantia* mercurialia sæpius repetita.
2. *Decocta purificantia*, medicamenta *mercurialia* & *sulphurea*. Cicutæ, ** ledum palustre, lapatum acutum, specifica censentur.

Externe 1. Capilli sunt *abscindendi*.

2. Crustæ *unguento juniperino*, vel cicutæ in lacte cocta emolliantur.
3. Dein capilli & crustæ *emplastro picato* eradicentur.
4. Caput sæpius *lotione helleborata*, vel solutione salina, ut ex sale alcalino, vel ex sale tartari vel sedo acri contuso, vel spiritu salis unguento mixto, vel unguento sulphuris cum succo citri, abluatur.

* D. STEGER *diff. de Tinea. Budæ* 1782.

** Ill. STOERCK *libel. de cicutæ* pag. 173. & Cel. STOELLER *Beobachtungen* p. 139. externo & interno usu cicutæ tineam curarunt.

2. *TINEA VENEREA*. Præter luis venereæ signa adsunt crustæ albæ circa tempora & frontem, & in malo inveterato maculæ & pustulæ venereæ frontis, atque herpes farinaceus aurium.

Curatur hæc tinea interno usu mercurii.

Externe unguentum cum præcipitato rubro prudenter adhibeatur.

In malo inveterato lotionem cum solutione sublimati, vel penicillationem crustarum cum aqua caustica pro condilomatibus utilem deprehendi.

M E N T A G R A.

Est peculiaris scabies circa mentum, quæ in crustas abit.

SPECIES sunt :

1. *MENTAGRA VENEREA*. Ingentem numerum talium crustarum, gluten viscidum exsudantium bis, in magna copia venereorum vidi. Præter usum internum mercurii pars affecta aliquoties de die aqua phagædenica, vel solutione sublimati vel lacte mercuriali ablui debet, unguentum mercuriale de nocte imponatur. His remediis non juvantibus illinantur crustæ aqua caustica ad condylomata.

2. *MENTAGRA LEPROSA* est lepra, mentum & faciem afficiens. *Curatur* ut lepra.

3. *MENTAGRA INFANTUM*. V. *Crusta lactea* in mento.

4. *MENTAGRA PLINII*. Fuit impetigo in mento, quæ Romæ quondam contagiosa fuit. Vide *Impetigo*.

MALUM MORTUUM.

Est pustula, quæ in crustam fuscam, latam & crassam cum quadam insensilitate & turpi aspectu, abit.

In coxis & tibiis frequenter observatur, rarius in facie.

Subinde unica est in toto corpore, subinde plures, sed distantissimæ observantur. Hæ crustæ sunt siccæ, sine dolore, fixæ, pertinacissimæ, vix pruriginosæ. Crustis elapsis cutis infra est granulosa sed non exulcerata.

Sanatur ut tinea per dropacismum V. *tineam*.

EXANTHEMA LABIALE.

Est efflorescentia vesicularum, quæ in labiis erumpunt & cito in parvas crustas abeunt.

Febres intermittentes sæpe hac crisi terminantur.

Curatio præter interna remedia diluentia nihil exigit.

EXANTHEMA SUBAXILLARE.

Est efflorescentia vesicularum, quæ in cavo subaxillari uno vel utroque erumpunt, magnam copiam

humoris visceri sæpe excernunt & in crustas tenues ebeunt.

Eruptio tempore æstivo frequenter contingit.

Curatio exigit diligentem ablutionem cum aqua calida, & interna remedia diluentia: juscum cum charophyllo & fumaria profuit.

CLASSIS VII. SQUAMMÆ.

Hæc classis continet morbos cutaneos, in quibus cuticula tota vel sub forma squammarum vel furfurum a cute secedit.

SPECIES hujus classis sunt:

FURFURATIO.

Est epidermidis secessus sub forma *furfurum*.

Furfuratio est raro morbus per se, sed ut plurimum symptoma porriginis, herpetis.

Curatio hinc juxta morbum, a quo oritur, institui debet.

DESQUAMMATIO.

Est epidermidis secessus sub forma *squammarum*.

Hic morbus etiam symptoma est impetiginis, vel ichtyosis, hinc ut hi morbi curatur.

EXUVIA EPIDERMIDIS.

Est cuticulæ secessus a cute sub forma magnarum laminarum.

CAUSÆ, quæ epidermidem a cute in latis portionibus solvunt, sunt 1. inflammatio erysipelacea. 2. Calor aquæ ebullientis, aut solis. 3. Maceratio cutis in aqua. 4. Putredo gangrænosa. 5. Vescicatorium aut aliud acre cuti impositum. 6. Acrimonia sub epidermidem deposita, ut in quibusdam febribus & ab esu delphini contingit.

Curatio externa exigit, ut pingua, butyrum simplex aut ex fructu cacao applicetur, sic facile & sua sponte renascitur epidermis.

EXUVIA EPIDERMIDIS & CUTIS A RAPHANIA. Non solum epidermis sed & ipsa vera cutis hinc inde secedit, adeo ut nudi muscoli & tendines videri possint. * *Medela* exigit, ut externe unguentum saturninum applicetur.

P O R R I G O.

Est morbus, in quo in capillata capitis parte rimæ siccae & callosæ oriuntur, quæ perpetuo scatent furfure albescente inter pectinandum deciduo.

SPECIES sunt :

1. *PORRIGO FURFURACEA*, quam mox descripsi.
2. *PORRIGO LUPINA*, quæ squammas instar cicerum format. Vide *Scabies capitis lupina*.

* *Cel. TAUBE Geschichte der Kriebel - Krankheit. 1782. Göttingen p. 153.*

3. *PORRIGO FARINOSA* seu *SPURIA*,
est congeries materieî unguinosæ pulverulen-
tæ, quæ ob pectinationis defectum in capite
cumulatur, & crustam sordidam, atque fæti-
dam, sub pectine farinæ crassæ forma delaben-
tem, constituit.

Materies hæc farinosa vel furfuracea humor se-
baceus glandularum capitis esse videtur. Sub
his sordibus copiosa proles pediculorum tuta
hospitatur.

Curatio exigit diligentem & frequentem pecti-
nationem. *Porrigo* autem *vera* seu *furfuracea*,
ut *scabies capitis*, curatur.

L I C H E N.

Est macula solitaria, rubra, aspera, sicca, admodum
pruriens, quæ in tenuissimum furfurem solvitur.

CAUSA est peculiaris acrimonia. *Curatur* ut *impetigo*,
cujus levissima esse videtur species. *Externe* sa-
liva jejuna aut solutione sublimati cum sale ammo-
niaco, aut unguento helleborato vel ex mercu-
rio præcipitato rubro vel albo macula fricari de-
bet.

I M P E T I G O.

Est morbus, in quo multæ maculæ rubræ, duræ, sic-
cæ, prurientes & asperæ oriuntur, quæ a facie
vel collo ortæ, totum corpus petunt & vel in
furfures vel in tenues squammas resolvuntur. Hinc
est *lichen* in toto corpore.

SPECIES sunt :

1. *IMPETIGO BENIGNA*. Cutis maculae ru-
bentes & prurientes evadunt crassae, durae &
tumidae, nec non leviter humescunt, & ex
humore albido transudante squammæ fiunt al-
bæ, crassitie papyrum tenuissimam æquantes,
quæ tam digitis auferri possunt, quam per
sudores decidunt, quibus demptis profluit san-
guis. Hæc impetigo etiam ungues aliquantum
destruit. Subinde in capitis cute incipit.
2. *IMPETIGO MALIGNA*, est illa, quæ cu-
tem pessime exulcerat.
3. *IMPETIGO HEREDITARIA*, quæ in in-
fante a parentibus eodem morbo affectis ob-
servatur.
4. *IMPETIGO A CONTAGIO*, ut balneo,
lecto, osculo contracta. Solis osculis impetigo
menti Romæ quondam pandemia fuit. *
5. *IMPETIGO SENUM*, quæ ab acrimonia
senili in senibus observatur.
6. *IMPETIGO AB INGESTIS ACRIBUS*
ut salis, vini vel aromatum abusu.
5. *IMPETIGO VENEREA*, quæ a viru ve-
nereo.
8. *IMPETIGO SCORBUTICA* quæ, a scor-
buto.

* PLINII *Hist. nat.* L. 26. C. I. Cel. GRUNER *morb. antiquit.* p. 162. solide monstrat mentagram Plinii im-
petiginem fuisse.

9. *IMPETIGO LEPROSA*, quæ a lepra latente.

10. *IMPETIGO FEBRIS SEQUA*, quæ febres quandoque sequitur. Cortex tentandus.

11. *IMPETIGO RETROPULSA*, asthma, cœcitatem & alios morbos infert, hinc acrimonia in cutem vesicatoriis est reducenda.

CAUSA PROXIMA impetiginis est serum acre in cutem depositum. Serum acre redditur victu falso & acri, acrimonia latente venerea, aut scorbutica, aut leprosa. Nam hos in morbos sæpe malum erumpit.

Curatio impetiginis benignæ tentatur:

1. *Purgantibus*, cicuta, acidulis, succo pomorum acidorum, cort. peruv. sarsaparilla.
2. *Decoctis purificantibus* chamomillæ & fumaris.
3. *Solutione* mercurii sublimati.

Externe balnea ex chamomillis vel thermis sulphureis conducunt, laudantur præterea externe radix lappati aceto macerata, succus ricini contusi, spiritus ligni sancti, sapo venetus cum spiritu vini rectificato, oleum tartari per deliquium, sinapi, medicamenta sulphurata, mercurialia, plumbata, martialia. * Efficacissimum vero remedium esse censetur herba antilichenia. **

* De his omnibus vide egregiam D. LUPINI *diff. de lichene*. Budæ 1778.

** Cel. HILLARY *Beobachtungen über die Veränderung der Luft auf der Insel Barbados*. p. 430.

In impetigine *scorbutica* & *venerea* simul antidota harum acrimoniarum adhibeantur.

I C H T H Y O S I S.

Est morbus, in quo diversæ corporis partes teguntur squammis siccis & albidis, successive superincumbentibus, eodem ordine ac modo, quo squammæ piscium sibi incumbunt. *

Ægroti subinde ut pisces fœtent, & in Asia squammæ circulo rubro sunt cinctæ.

Curatio. Specificum & unicum in hoc morbo remedium est decoctum ex cortice intermedio ulmi. **

T Y R I A S I S.

Est lepræ species, in qua cutis a carne subjacente putrida facile detrahi potest. ***

A scalpura cujusvis partis farina ac furfur excutitur, demum ubique oriuntur maculæ albæ. Nasus & digiti incrassantur, ut in lepra & omnes pili in toto corpore defluunt.

CAUSA PROXIMA est virus leprosum cum putredine junctum.

* *Acta Lipsiensia* 1688. & *Cel. SAUVAGES Nosologia methodica* T. II. p. 572.

** *Cel. LETTSOM Med. Nachrichten von dem allgemeinen Dispensatorio in London. Altenb.* 1777. p. 131.

*** A serpente tyro, qui cutem facile exuit, nomen habet.

Curatio incipientis morbi ut in lepra est, sed adde
internum usum acidi vitrioli.

ASPERITAS CUTIS.

Est cutis aspera, crassa, fusca vel rubens.

SPECIES sunt:

1. *ASPERITAS A VENTO*, facies vento frigido diu exposita redditur aspera, sic etiam fit *a frigore*. Est rusticis & peregrinantibus familiaris.
2. *ASPERITAS A LIXIVIO* vel *SAPONE*, quæ in manibus lotricum invenitur. Alkali causticum saponis cutem sic deturpat.
3. *ASPERITAS AB ÆTATE*. Quo provectioris est homo ætatis, eo crassior fit cutis, præsertim in facie.

Curatio cutis asperæ butyro cacao & aliis pinguibus obtinetur. *Cosmetica* raro prosunt præter bilem bubulam.

CUTIS RUGOSA.

Senium, vel peculiaris laxitas cutis vel consuetudo frontem perpetuo rugandi, faciunt ut hæc, præsertim in fronte, in rugas contrahatur.

1. *RUGOSITAS A LAXITATE* fumo aromatico ex myrrha curari dicitur.
2. *RUGOSITAS LEPROSA*. Frons in hoc morbo rugosa fit, malum ut morbus, a quo oritur, est incurabile.
3. *RUGOSITAS SENILIS* est incurabilis.

CLASSIS VIII. CALLOSITATES.



Sunt mutationes epidermidis in substantiam albidam, duram, crassam & insensilem.

Huc ergo referuntur sequentia genera:

C A L L U S.

Est epidermis indurata, crassa & insensilis.

CAUSA PROXIMA est muci malpighiani major secretio, exsiccatio & induratio. Irritatio secretionem, pressio & aer condensationem faciunt.

Causæ remotæ sunt diuturnus *attritus*, unde major muci malpighiani secretio, & induratio. Idem ab acore minerali * & a calore fervido observatur. **

* Spiritu vitrioli aut sulphuris adeo cuticula induratur & increassatur, ut tales ignem devorare possint. DESLANDES *Brem. Magazin* T. I. p. 665.

** Frictione & ingenti calore destruitur cuticula, at renascitur alia, primæ simillima, sed continuata causa frictionis, calorisve ad primam cuticulam novæ aliæ laminæ callosæ perpetuo accedunt, quæ demum in adeo crassum corneumque tuber abeunt, ut tales homines prunas ardentes vel ferramenta candentia in manu circumgerere, & fuso metallo demum manus lavare discant. Id *Magnus BOERHAAVIUS* de fabris ferrariis testatur, id *Illustr. HALLERUS* in vitrariorum officinis vidit.

SPECIES sunt:

1. *CALLUS IN PALMIS MANUUM*, oritur ab assiduo labore, & tractatione instrumentorum crassorum.
2. *CALLUS IN PLANTIS PEDUM* accrescit, si pedibus nudis longo tempore incedamus. * Dolentissimus evadit talis callus, si rimam seu fissuram contrahit. Optimum remedium in hoc morbo fuit mihi unguentum album camphoratum cum unguento neapolitano mixtum, si calceus simul induatur latior. **
3. *CALLUS FISTULARUM & ULCERUM*, est margo callosus, qui ulcera circumdat, oritur vi exsiccante aëris aut turundis multum prementibus.

Curatio. Ablata pressione callus manuum & pedum sua sponte sensim evanescit, aut maceratione in aqua, applicatisque unguentis camphoratis emollitur, vesicatorio, vel phosphoro tollitur.

C I C A T R I X.

Est callus a consolidato vulnere vel ulcere relictus.

* A sola calida arena Ægyptiis soleæ non minus duræ, quam bobus sunt, ut absque dolore possint ferro calcari; & in siamensium regno super ignitas prunas tuto ingrediuntur. *Illustr. HALLERÏ Element. Physiologiæ* T. V. p. 58.

** *Cel. CAMPER Abh. über den besten Schuh.* p. 49.

Formatur a muco malpighiano, quo vulnera ultimam
tim conglutinantur.

Cicatrix pulchra vocatur, quæ cute, nec elevatior,
nec depressior est, ut in vulneribus, acuto in-
strumento inflictis & apte unitis videre est.

Diversæ observantur cicatricum *species*:

1. *CICATRIX ELEVATA*, oritur, si caro
ultra vulneris libellam luxurians, exsiccantium
vi in cicatricem exsiccet. Hæ cicatrices ut-
plurimum iterum aperiuntur, nisi id apta com-
pressione & roborantibus impediatur.
2. *CICATRIX CAVA*, contingit, si per sup-
purationem cutis & membrana adiposa multum
consumpta est. Sic vulnera cariosa, spina ven-
tosa, & profundæ ambustiones relinquunt
cicatrices cavas, quæ infundibuli forma ad
ossa fere pergunt. Hæ cicatrices sunt insana-
biles.
3. *CICATRICES A GRAVIDITATE*. Re-
ferunt hæ cicatrices in regione hypogastrica ab-
dominis, in inguinibus & interioribus femoris
partibus *strias albicantes*, adhuc diu post par-
tum conspicuas, sed cum tempore fere eva-
nescentes.
4. *CICATRICES VARIOLOSÆ*, quæ præ-
sertim in facie a prægressis variolis veris re-
manere solent,
5. *CICATRICES LEPRÆ ASTURIENSIS*,
quæ rosei coloris, infra cutis libellam depressæ
& lucidæ esse solent.

C L A V U S.

Est tuberculum callosum, album, rotundum, in digitis vel plantis pedum. *

Sed clavorum locus frequentissimus in dorso digiti minimi, quandoque vero in aliis, est: quandoque inter digitos in superficie interna utraque duorum digitorum sibi accumbentium duo clavi inveniuntur.

SPECIES clavorum sunt:

1. *CLAVI SUPERFICIALES*, qui epidermidi & cutis superficiei externæ solummodo adherent.
2. *CLAVI PROFUNDI*, qui cuti, tendinibus aut periosteo adherent, hinc a pressione cutis dolent. In suo centro *nucleum* durissimum habent, quo eradicato pars affecta non dolet, usque dum novus nucleus efformetur.

Nascuntur clavi a pressione loculi digitorum, hinc familiares sunt illis, qui calceis arctioribus aut latioribus utuntur.

Curatio exigit:

1. Ut clavus pediluvio tepido bene emolliatur, & ut nucleus clavi dein unguibus digitorum vel cultello caute eximatur.
2. Dein clavus cera viridi, vel folio fedi, aceto forti macerato, aut emplastro diachilon vel fa-

* ROUSSELOT *Toilette des pieds.* & Ill. RICHTERS *Chirurg.* T. I. p. 428.

ponato vel emplastro ad clavos per aliquot septimanas tegatur & a pressione defendatur. Subinde clavis solo emplastro vesicatorio vel tinctura cantharidum auferri potest. Efficacissimum remedium est, si globulus ex unguento de ranis cum mercurio quadruplicato ope emplastri longi & tenuis ad clavum applicetur. *

Nimis profunde excisus clavis ingentem totius cruris inflammationem, gangrænam, vel cancerum fungosum vel tetanum causare potest.

3. *CLAVUS IN PLANTA PEDUM*. Quandoque unus, quandoque integra congeries clavorum plurium invenitur. *Salus* a foliis sedi minoris recentis contusis & per noctem in aceto maceratis atque clavis applicatis speranda. **

4. *CLAVUS* seu *VERRUCA SUB UNGUE*. Unguem elevat, ingentem excitat dolorem, & a minima mole quandoque in ingens & durissimum excrescit cornu. *Medela* exigit, ut unguis pediluvio maceratus ad latus utrumque


* *Cel. CAMPERS Abh. über den besten Schuh. Wien 1782.*

** *Celeberrimus CLOSIUS*, practicus expertissimus Pestinensis ægrotam, quæ jam a longo tempore congeriem 16 vel plurium clavorum sub pollicis majoris haluce gerebat, intra aliquot septimanas hac methodo sanabat.

verrucae subungualis incidatur, dein unguis a verruca elevetur & cornu excidatur. *

5. *CLAVUS AD CRISTAM ILII*, hic in feminis a nimis arctis thoracibus, cristas ilii prementibus, oritur.

CLASSIS IX. EXCRESCENTIÆ CUTANEÆ.



Sunt parva tubera, quæ ultra cutis libellam prominent.

Hi morbi per succi nutrititii copiosorem affluxum & adhæSIONem fieri videntur.

GENERA hujus classis sunt :

V E R R U C A.

Est tuberculum durum, scabrum, indolens, ex cute prominens. **

In facie & manibus, raro in partibus aliis nascuntur.

CAUSA est raro cognita. An acrimonia verrucosa datur, & an hæc sit contagiosa, non adeo clare notum est.

SPECIES verrucarum sunt :

1. *VERRUCA VULGARIS*, quæ in basi & apice ejusdem diametri est.

* *Cel. CAMPER* l. c. p. 52 & 56.

** *Ill. RICHTER Chirurgie* T. I. p. 420.

2. *VERRUCA PENSILIS* seu *ACROCHORDON* est verruca, quæ ope petioli angustioris cuti adhæret.
3. *VERRUCA SESSILIS* seu *PORRUM*, est verruca cuti immerfa, seu vix extra cutem prominens.
4. *VERRUCA CARNEA* seu *MOLLUSCA* est tuberculum molle, sensile, cuti concolor vel rubens, sæpe pilosum. In naso & facie ut plurimum invenitur. Videtur admodum magna glandula cutanea quasi esse.
5. *VERRUCA MADIDA* seu *MYRMECIUM*, est verruca mollis, nuda, & semper madida.
6. *VERRUCA GREGALIS*. Dantur verrucæ admodum parvæ, quæ gregatim in facie vel manibus erumpunt, sed etiam sæpe sponte evanescent.
7. *VERRUCA FEBRILIS*, quæ cum febre ut exanthema in toto corpore erumpit. V. *Variolas verrucosas*.
8. *VERRUCA CANCROSA* seu *MALIGNA*, est verruca livens vel rubens, dolens, varicosa, quæ in cancrum abit. *
9. *VERRUCÆ VENEREÆ*, sunt moris, vel frambæsiis similes, quæ in venereorum facie erumpunt, ut aliquoties vidi.

* DE VENS *Diff. de fungo cancroso ex verruca orto.*

Curatio verrucarum obtinetur.

1. *Ligatura*, quæ in verrucis petiolatis ope filii sericei, vel setæ equinæ peragi potest.
2. *Excisione*, qua verrucæ cancrôsæ curantur.
3. *Causticis*: ut spiritu salis concentrato, aqua forti, oleo camphoræ caustico, quibus verrucæ mediante penicillo bis de die illini debent.
4. *Inustione*, acus ad candelam excalescens in verrucam infigitur.
5. *Fricione* verrucæ cum *sapone nigro*, vel *lacte* vel *folio ficus*, vel *cerumine aurium*.
6. Applicatione *emplastri vesicatorii*, & *tincturæ cantharidum*.
7. *Remediis sympatheticis*. Sic verruca pomo, vel carne, vel sanguine, ex anguillæ capite abscisso stillante, multum fricta, & remediis dein in terram sepultis, evanescere dicitur. Mihi res, sæpius tentata, non successit.

Verrucæ *gregales* sæpe dato purgante, dein asa fatida aliquot septimanis assumpta, sponte evanescunt. Verrucæ *venereæ*, ut condylomata venerea, curantur.

CORNUA CUTANEA.

Sunt excreſcentiæ callosæ vel verrucosæ, sed admodum magnæ.

Subinde totum corpus vel pars corniculis exstantibus horret. *

* *Ill.* HALLERUS in suo magno opere physiologico observationes de cornibus cutaneis congeſſit. Tom.

Curantur spiritu nitri fumante, aut solutione argenti, qua cornua circa basim sæpius illini debent, vel *excisione* cornuum & cute.

H Y S T R I C I A S I S.

Est papillarum, setis rigidis, ut hystrix habet, similitum, copiosa progenies in cute.*

Nec *causa* nec *curatio* miri hujus morbi cutanei nota est.

C O N D Y L O M A T A.

Sunt verrucæ molles, quæ circa anum & pudenda utriusque sexus excrescunt.

Respectu originis, figuræ, magnitudinis & indolis admodum variæ sunt hæ excrescentiæ.

v. p. 30. Ex fronte cornu natum refert ZACUT. ex maxilla BARTHOLIN, ex capite duo cornua LEIGH. cornu 9 unciarum de capite femine defectum THORRESBI, undique ex cute capitis INGRASSIAS, ex omnibus digitis, *Phil. Trans.*, ex femore vetulæ *Journal. de Medic. & Histoire de la Chirurgie*, ex vulnere genu, BENEDICTUS, undique ex manibus, pedibus, capite & fronte, INGRASSIAS, ex articulis artuum, natibus & mammis SYLVIVS.

* In Anglia fuit homo visus, cujus caput setis rigidis, pellucidis, 6 lineas longis, 2 vel 3 crassis, horrescebat. Hæ setæ quovis autumno decidebant. Is genuit 5 filios eodem morbo affectos. V. *Phil. Trans.* n. 424. & *Journal. de Med.* Mars 1756.

SPECIES esse solent:

1. *CONDYLOMATA VENEREA*, quæ vix dolent & ex prægressis vel præsentibus aliis symptomatibus venereis noscuntur.
2. *CONDYLOMATA HÆMORRHOIDALIA*, quæ absentia symptomatum venereorum, atque prægressis hæmorrhoidibus noscuntur.
3. *CONDYLOMATA MALIGNA*. Hæc dolent, livent, & in cancerum abeunt: ex male tractatis condylomatibus aliis nascuntur.

Respectu figuræ vocantur condylomata.

1. *Ficus* vel *sycocis*, quæ magna sunt & ficus figuram referunt.
2. *Cristæ*, quæ cristis gallinaceis similia sunt.
3. *Tymus*, quæ flores tymi vel brassicam caulifloram repræsentant.

CAUSA PROXIMA, est evolutio vasorum, quæ papillas cutaneas constituunt.

Curatio. Condylomata venerea præter internum mercurii usum quotidie bis solutione saturata mercurii sublimati, vel aqua caustica ad condylomata ope penicilli illini & illico linimento mercuriali obtegi debent.

Condylomata autem jam nimis magna & sarcotica, cultro, forfice vel si petiolata sunt, ligatura auferuntur.

Condylomata hæmorrhoidalia linimento catheretico, ex pulvere aluminis usti, opii, flammulæ jo-

vis cum unguento de linaria subactis, sæpe curantur.

Condyloma *malignum* ut cancer tractetur.

Condylomata *indurata* cepa oleo cocta emolliantur, ac dein pulvere sabinæ conspergantur. *

F R A M B Æ S I A.

Est morbus, in quo prægressis pustulis variolis valde si milibus excrecentiæ fungosæ, mori fructus referentes, præcipue in plantis pedum quandoque in toto fere corpore excrescunt. **

Morbus hicce americanis est endemius & licet mercurio curetur & per coitum inficiat, tamen veneris non censetur, nam quos semel exercuit, si bene ab eo curati sint, hos non amplius aggreditur; genitalia maxime afficit. Morbo inve-

* *Neue Versuche und Bemerkungen einer Gesellschaft zu Edimburg.* 3. B. p. 373.

** Americani has excrecentias *Pians* seu fungos dicunt, hinc *Cel. CARTHEUSERUS* hunc morbum *lepram fungiferam* nominat, *Cel. SCHILLING* de morbo in Europa pene ignoto, quem Americani vocant *Jaws*. 1770. *Trajecti ad rhenum* & *Cel. NIELEN*, von den indianischen Pocken, oder den sogenannten *Jaws*. Vide *Sammlung für praktische Aerzte* 7 Band 2 und 3 Stück.

terato sese adjungunt ulcera dysepulota, exostoses, caries, anchyloses & macies.

Curatio. A morbi initio usque ad finem decocta purificantia ex herbis saponaceis & leniter sudorifera medicamenta dentur. Post integrum fungorum incrementum, quod intra 3 menses ordinarie contingit, solutio sublimati corrosivi cum decocto saturatissimo sarsaparillæ detur. Sanato toto morbo *princeps fungus*, qui *Mamapian* Guineensibus dicitur, solutione caustica consumi debet.

Nigritæ fuliginem lebetum æneorum, succo limoniorum dilutam, ulceribus & fungis applicant.

CLASSIS X. ULCERA CUTANEA.



Sunt superficialia ulcera seu solutiones continui purulentæ in sola externa cutis superficie.

Genera hujus classis sunt.

EXCORIATIO PURULENTA.

Est ulcus superficiale & purulentum in cutis superficie.

SPECIES sunt:

1. *EXCORIATIO BULLOSA.* Ea est, quæ cum bulla, vi aut sua sponte rupta, incipit. Exigit linimentum molle.

2. *EXCORIATIO A VESICATORIO. V.*
Bulla a vesicatorio.

3. *EXCORIATIO ACRIMONIOSA.* Materia venerea, cancrōsa, scabiosa vel alia cuti illita prævia inflammatione ulcus superficiale excitat.

Curatio exigit unguentum molle cum specifico contra detectam acrimoniam.

4. *EXCORIATIO PAPILLARUM IN MAMMIS*, quæ a violenta suctione infantis aut acrimonia ejus salivæ oritur.

Curatur butyro cacao vel pulvere insperso ex amylo, bolo armena & saccharo albo.

INTERTRIGO.

Est excoriatio genitalium vel alius partis, madens, & rubens, ab urinæ vel sudoris acrimonia.

SPECIES sunt :

1. *INTERTRIGO GENITALIUM* est lactentibus familiaris, oritur custodum negligentia, quæ infantes in linteis, urina fæcibusque conspurcatis, diu sine purgatione relinquunt.

Curatio exigit diligentem mutationem linteorum mundorum, & insersionem pulveris amyli, lycopodii, vel boli armenæ.

2. *INTERTRIGO SCROTI* sudantibus a sudore acri, & in incontinentia urinæ adultis etiam familiaris est.

3. *INTERTRIGO SUBAXILLARIS*: tempore æstivo a sudore acri cavum subaxillare sæpe exoriatur.

4. *INTERTRIGO AURICULARIS*. Infantes retro aures sæpe exoriari solent, præsertim si scabie capitis laborant.

Curatio intertriginis exigit, ut excretio non subito impediatur, sed prius datis purgantibus locus exoriatus ab initio cerato vel butyro cacao, in fluxu fervetur dein bolo armena inspergatur. Cerussa plumbi evitetur.

A P H T H Æ.

Sunt parva, albicantia & superficialia ulcuscula in oris cavo, vel, quod rarius est, in genitalibus, primis viis, aut trachea.

Incipiunt aphthæ sub forma vesicularum miliarium albarum, quæ in apice foraminulum gerunt, dein collabuntur & aliquantum lateſcunt.

SPECIES aphtharum sunt diversæ respectu *loci* & *indolis*.

1. *APHTHÆ INFANTILES*. Lactentibus sunt familiares & a lacte corrupto infantis vel nutricis fieri creduntur. Palatum, linguam & genas internas obsident, non raro simul in genitalibus observantur.

Infantes lac sugere recusant, pervigiles & febrientes sæpe fiunt, nutrices calorem oris infantis sub lactatione sentiunt, & non raro papillæ mammarum aphthis inficiuntur.

Curatio exigit, ut infans syrupo de spina cervina vel manato purgetur, & ut os aphthosum aqua vitriolata cum melle rosacco vel solutione boracis, quæ etiam interne dari potest, sæpius de die eluatur.

Nutrix simul purgetur & bibat decoctum bardanæ atque ab omnibus acidis, acribus & vino abstineat.

2. *APHTHÆ ADULTORUM*. In palato, interna superficie genarum vel labiorum, subinde in tonsillis vel faucium cavo una vel plures magnæ aphthæ oriuntur. Apex & latera linguæ punctis hinc inde pertusa videntur. Locus aphthæ sub masticatione aut deglutitione acriter dolet. Febris abest. *

Curatio est ut in aphthis infantum.

3. *APHTHÆ FEBRILES*. Erumpunt cum febre acuta & non solum oris cavum, sed subinde simul fauces, tracheam, œsophagum, atque primas vias obsident. V. apud Authores descriptionem *febris aphthosæ*.
4. *APHTHÆ GANGRÆNOSÆ*, livent & fætent: observantur in angina gangrænosa, &

* Vidi nuper in quodam pago multos rusticos os admodum habuisse aphthosum, cum lac, e vaccis aphthosis mulsum, frigidum tempore messis potarent, nobiliores autem hujus pagi, qui lac bibebant calcfactum, aphthis non afficiebantur.

febre maligna. Exigunt collutorium ex cortice peruviano, ruta & camphora.

5. *APHTHÆ VENEREÆ* ulcera superficialia, muco gryseo tecta, faciunt: noscuntur signis luis venereæ, curantur collutorio ex amylo & mercurio gummoso, & decocto sarsaparillæ.

6. *APHTHÆ MERCURIALES*, quæ cum ptyalismo & oris foetore erumpunt, præsertim orificia ductuum salivalium *Stenoni* afficiunt.

Curantur purgantibus, balneis calidis, & decocto emolliente lacteo.

7. *APHTHÆ SCORBUTICÆ* noscuntur stomacace gingivarum & aliis scorbuti signis.

Curantur interne antiscorbuticis, externe melle rosaceo & spiritu salis tangantur, atque deintindura gingivali eluantur.

Huc pertinet *cancer aquaticus*, qui magna est aphtha, cito in gangrænam buccarum vel labiorum transiens, curatur etiam interno & externo usu spiritus salis marini.

8. *APHTHÆ SYMPTOMATICÆ* sunt illæ, quæ febri miliari, petechiali, dysentericæ, phthyfi, gangræne pulmonis & cancro superveniunt, atque utplurimum incurabiles sunt.

F I S S U R Æ.

Sunt solutiones lineares, siccæ vel humidæ, in cuticula vel cute.

SPECIES sunt:

1. *FISSURÆ A FRIGORE*, quæ in labiis oris, manibus, pedibusque hieme observantur.

Curantur unguento ad perniones.

2. *FISSURÆ LABIORUM A VENTO*, quæ tempore ventoso itinerantibus contingunt.

Curantur butyro cacao vel unguento ad labia.

3. *FISSURÆ AB ACRIBUS*. Ut accidunt ancillis lixivium calidum incaute tractantibus.

Curantur butyro. Fissuræ, quæ in manibus ab atramento typographico oriebantur, unguento alcalino curabantur.

4. *FISSURÆ PAPILLARUM MAMMÆ*. Nutricibus a violenta & perpetua suctione infantis sunt familiares.

Curatio exigit abstinentioniam aliqualem a lactatione, butyrum cacao & pulverem ad mammillas, qui ex amylo, sacharo & bolo armena constat.

R H A G A D E S.

Sunt malignæ, siccæ & profundæ fissuræ cutaneæ.

SPECIES sunt:

1. *RHAGADES VENEREÆ*, quæ in volis manuum plantisque pedum, atque circa ani & vulvæ orificium oriri solent. Noscuntur morbis venereis prægressis.

Curantur admodum difficulter. Interne dentur mercurialia. Externe pomatum ex mercurio præcipitato rubro vel albo, aqua phagædenica, vel solutio saturata mercurialis adhibeatur.

2. *RHAGADES LEPROSÆ* sunt, quæ in lepra, elephantiasi & frambæsia totam fere cutem occupant.

3. *RHAGADES ANONIMÆ*, quas in hominibus nec venereis, nec leprosis ex causa adhuc incognita in volis manuum vidi. Cuticula crassa, rhagadibus plena erat, gluten copiosum ex rhagidibus exsudabat. Nec mercurius, nec alia medicamenta profuere. A decocto saturato chærophilli interne & externe adhibito sæpius cuticula cum rhagadibus quandoque secessit, laudatur etiam auripigmentum, cum unguento digestivo. Nuper hæc curatio tentata fuit: *

1. Lavetur manus *lixivio cinerum* ex ligno.
2. Dein *aqua pulviali destillata* abluantur.
3. Dein manus sequenti unguento illinantur. *℞.*
Sevi vervecini, ceræ albæ, succi pomorum borsdorfensium & olei olivarium p. æquales, in unguentum redigantur, hocce chirothecæ

* *Cel. THEDEN Bemerkungen. 2. Theil. p. 262.* Rhagades digitorum & volæ manus jam a 10 annis vexantes in proprio corpore hac methodo sanavit.

illinantur, quibus manus die noctuque induantur.

4. Interne *Tinctura antimonii Thediana* & ad vespervas *gummi guajaci* cum gr. v. *saponis antimonialis* detur.

4. *RHAGADES SENILES*, quæ in senibus a cutis siccitate & transpiratione suppressa oriuntur.

Curatio prior tentetur.

CLASSIS XI. VULNERA CUTANEA.



Sunt vulnera, quæ solam cutem lædunt.

Huc maxime pertinent.

EXCORIATIO CRUENTA.

Est cuticulæ vel cutis a partibus subjacentibus cruenta & violenta seperatio.

SPECIES excoriationis cruentæ sunt:

1. *EXCORIATIO A VIOLENTO ATTRITU*, quæ supra partes ossibus sustentatas, ut supra spinas tiliarum, cranium aut digitorum articulos frequentissime contingit. Hæc excoriatio summe dolorifica est, & paulo post multum inflammatur.

Nibil utilius est quam fomentum ex aqua *Thediana* vel ex vino tepido cum aliquot guttis extracti saturni. Ipsa viva excoriatio parva por-

tione emplastri anglicani tegatur. Evitentur spiritus & unguenta præsertim in corporibus cachecticis, in his ab excoriatione violenta sæpe magnum ulcus erysipelatosum excitatur.

Huc etiam pertinet *Excoriatio* volæ manus a labore, aut *pedis* plantæ ab itinere, excoriatione in interna & summa *femorum* parte ab equitatione, & in regione *ossis sacri* aut calce pedis a longo & duro decubitu. V. *Erythema ab attritu*.

2. *EXCORIATIO UNGUICULARIS*, quæ ab unguibus hominis, fellis, vel alius animalis infligitur. Longam & cruentam repræsentat lineam, sic etiam infantes, quibus cutis in capite vel alio loco moleste prurit, unguibus locum prurientem adeo fricare solent, ut sanguis ex cute erumpat.

S C I S S U R A.

Est solutio cutis, cruentam lineam referens, acuto instrumento inflicta.

Curatur optime, si vulnus emplastro anglicano unia-
tur.

P R E S S U R A.

Est cutis intra ungues digitorum compressio.

Partes nerveæ sic pressæ ut labia, facies, aut mamma non raro tuberculum durum inflammatum retinent, quod in cancrum degenerare potest.

Curatio exigit, ut illico vino tepido inflammatio resolvatur.

M O R S U S.

Est cutis intra dentes animalis solutio cruenta.

Morsus Species sunt, *morsus simplex* & *morsus ab animali rabioso* vel *irrato*. Eadem mala producit ac pressura cum unguibus. Sed morsus animalis *irrati* vel *rabiosi* præterea rabiem inducit. V. *Vulnera venenata*, quæ in *chirurgia* descripsi.

Curatio morsus simplicis exigit balsamum Arcæi.

P U N C T U R A.

Est solutio cutis per acum, aliudve instrumentum acutum.

SPECIES sunt:

1. *PUNCTURA SIMPLEX*. Si cutis per acum pungitur, una alterave guttula sanguinis exit, quæ aëre exsiccatur & vulnus intra diem sua sponte, si sanguine tectum manet, sanatur.
2. *PUNCTURA COMPLICATA CUM CUSPIDE FRACTA ET INTRA VULNUS RELICTA*, ut sæpe cum festucis ligneis contingit.

Curatio exigit, ut corpus heterogeneum e vulnere extrahatur.

Si hæc extractio impossibilis est, vulnus lanceola dilatetur, aut excitetur vulneris suppuratio, sic festuca fere sua sponte exit.

3. *PUNCTURA A VIPERA VENENATA* vel *NON VENENATA*. Noscitur duabus puncturis juxta se locatis. Viperæ venenatæ ferre omnes duos in ore gerunt aculeos, plicatiles & cavos, quorum basis premit folliculos duos, succo venenato turgidos, qui in vulnus effunditur, dum animal mordet.

Puncturæ viperarum non venenatarum leves & sine periculo sunt, venenatarum autem puncturæ pessima symptomata & sæpe brevi mortem inferunt. V. *Toxicologiam*.

4. *PUNCTURA AB HIRUDINE*. Vulnus ab hoc verme illatum est triangulare, subin etiam ablato hirudine diu sanguinem plorat.

Curatur suasponte vel applicato vino calido.

ICTUS AB INSECTO.

Est punctura ab insecto illata.

SPECIES sunt:

1. *ICTUS A PEDICULO* facit parvum stigma cutaneum, cujus peripheria albescit.

2. *ICTUS A PULICE* stigma facit, cujus ambitus late rubet. An pediculus solum sanguinem, & pulex solum serum ex inflicto vulnere exfugit?

3. *ICTUS A CIMICE, CULICE & VESPA*, tubercula rubra & admodum prurientia relinquit in cute. Hac applicatione aquæ frigidæ, vel aceti curantur.

4. *ICTUS*

4. *ICTUS A SCORPIONE.* Hic multis animalibus lethalis est, sed hominibus raro, nisi magnus nervus pungatur. Laudatur externe oleum scorpionum, quod autem non semper symptomata aufert.

5. *ICTUS A TARANTULA.* Hujus ictus dolorem, dein tumorem livescentem, paucos post dies crusta nigricante obsitum, excitat; accedunt somnolentia, oppressionis anxietatisque sensus, & demum dolores in singulis corporis articulis, sed nunquam effrenis saltandi cupiditas homines demorsos incescit, ut vulgo narratur. Hæc symptomata diaphoreticis curantur.

6. *ICTUS A FURIA INFERNALI.* Hoc insectum est vermiforme, tenuissimum & vix duas lineas longum. In Suecia ex aere delabitur, & momento citius tum in hominum, tum in jumentorum corpora penetrat, atque tam diros excitat dolores, ut miseri homines quandoque intra horæ quadrantem pereant, dantur tamen, qui diutius durant.

Cognoscitur locus ex stigmate exiguo, fusco, & dolentissimo. Fenones lac recenter coagulatum parti vulneratæ imponunt, sic dolor remittit, & insectum foras prorumpit: alii cultro locum incidunt, & animal extrahunt.

V. *Toxicologiam.*

CLASSIS XII. INSECTA CUTANEA.

Insecta & vermes, qui externam corporis superficiem infestare & in vel sub cute sedem figere solent, frequentissimi hi sunt:

1. *PEDICULI* capitis & pubis in phthyriasi.
2. *ACARUS SCABIEI* in scabie verminosa.
3. *ACARUS EXULCERANS* in scabie ferina.
4. *LARVÆ MUSCÆ LEPRÆ* in lepra nigritarum.
5. *LARVÆ MUSCÆ CARNARIÆ ET VULGARIS* in vulneribus, ulceribus, variolis & lepra.
6. *PULEX AMERICANUS* sub cute americanorum.
7. *LARVÆ ÆSTROTORUM*, quæ sub cute bouum & rhangiferorum tubera faciunt.
8. *SYRONES* in pustulis manuum & pedum.
9. *GORDIUS MEDINENSIS* seu *DRACUNCULUS PERSARUM*, qui in telam cellulosa penetrat.
10. *LUMBRICUS EFFRACTOR*, qui quandoque ex abdomine effringit.
11. *FURIA INFERNALIS*, quæ cutem perfodit ex aere delapsa.
12. *ASCARIDES*, quæ intestinum rectum aut vulvam inhabitant.

13. *SCOLOPENDRA FORFICULATA*, quæ aures intrare amat.

14. *HIRUDO*, qui cuti adhærere solet hominum, qui stagna intrant.

P H T H I R I A S I S.

Est morbus, in quo cutis vel aliæ partes ingenti pediculorum copia obsidentur.

Hæc insecta cutem puncturis, pruritu, sordibus, ulcuscisque valde discruciant.

SPECIES sunt :

1. *PHTHIRIASIS CAPITIS*. Est infantibus familiaris, cum scabie, & porrigne furfuracea capitis conjunctus morbus. Capilli utplurimum *lendibus* copiosissimis, quæ *ovula* pediculorum sunt, obsidentur.

Curatio exigit frequentem pedinationem & purificationem capitis, atque insersionem seminis petroselini, sabadillæ.

2. *PHTHIRIASIS PUBIS*. In pilis pubis, scroti & inguinum pediculi lati, quos *platu-las* seu *morpiones* appellant, observantur. Hi profunde cuti immerguntur, molestum pruritum excitant, at cutem non ut pediculi capitis exulcerant.

Curantur unguento neapolitano, aut solutione saturata mercuriali, vel pulvere seminis staphisagriæ, vel infuso nicotianæ.

3. *PHTHIRIASIS SUPERCILIORUM.*

Pediculi, qui supercilia interdum inhabitant, sunt platulis similes.

Curantur aloe in aceto scillitico soluta, vel oleo spicæ vel unguento mercuriali.

4. *PHTHIRIASIS TOTIUS CORPORIS.*

Tota corporis superficies & omnia vestimenta, præsertim si lanea sunt, replentur pediculis & eorum lendibus.

Curatio exigit balnea ex nicotiana, inunctiones mercuriales cum oleo spicæ, & nova vestimenta.

Interne cortex cum mercurio adhibeatur.

5. *PHTHIRIASIS INTERNA.* Est ea, in

qua pediculi e diversis corporis locis exeunt, ut ex oculis, naribus, auribus, ore, cum urina, sputo, fecibus. Ægroti emaciantur & pereunt.

Curatio instituitur, ut in priori specie dixi.

HELMINTIASIS.

Est morbus, in quo cutis, vel aliæ partes externæ ingenti vermium vel larvarum vermiformium copia obsidentur.

SPECIES sunt:

1. *HELMINTIASIS CUTANEA.* Hic morbus endemius est Martinicanis, Westphalis, Transylvanis & Acridophagis. Miseris hoc morbo affectis per magnam corporis partem

vermiculi sub cute cuniculos agunt, & fere totius corporis pinguedinem consumunt, atque carnes hinc inde ad ossa usque devorant, adeo ut mors horrenda sequatur.

Curatio exigit interne & externe anthelmintica cum mercurialibus.

2. *HELMINTIASIS INTESTINI RECTI, VULVÆ, URETHRÆ, NARIUM, AURIUM, aut GINGIVARUM.* * Frequenti injectione tabaci, vel solutionis ex sale amaro & anthelminticis curatur.

3. *HELMINTIASIS ULCERUM.* Vermes, qui in ulceribus, aut vulneribus sordidis, diu aeri expositis, negligenterque deligatis, potissimum æstate, rarissime autem hyeme reperiuntur, ovulis, a musca vulgari vel carnaria in ulcera depositis, originem debent. Hi vermiculi etiam in scabie humida, variolis maturis, atque in lepra inveniuntur.

Curatio exigit, ut ulcera bene eluantur, & mundentur, dein oleum terebinthinæ, essentia aloes, vel elixirium vitrioli applicetur, vel mercurius dulcis inspergatur.

M A L I S.

Tubera, quæ insecta, vel vermes intra se recondunt, *males* dicuntur.

* Vidi nuper infantem, cui gingivæ ingenti copia vermium repletæ erant, solutione salis amari banc helminthiasim intra paucos dies curavi.

SPECIES malium sunt :

1. *MALIS PEDICULARIS*, in capite & facie bulla visa fuit, quæ incisa magnam copiam pediculorum continuit.

Curatio facta incisione exigit elutionem cum aqua vulneraria.

2. *MALIS A PULICE AMERICANO*. Hoc insectum in America degens vix conspicuum est, cutim peregrinantium maxime in cruribus subit, imo quandoque sub unguibus in cutem penetrat. Intra aliquot dies sub epidermide magnitudinem pisi acquirit & partem obsessam subinde ad ossa usque erodit.

Curatio exigit, ut insecta hæc quotidie ope cultri acuti ex cute evellantur, & locus cinere tabaci combusti inspergatur. Ubi vero totum crus his insectis obsidetur, linteum oleo picis intinctum applicari debet, hoc remedio hæc insecta cito separantur.

3. *MALIS AB ACARO SYLVESTRI AMERICANO* etiam sic tractatur.

4. *MALIS A GORDIO MEDINENSI* seu *DRACUNCULO PERSICO*. Est vermis non solum circa Medinam & in Persia, sed in omnibus æstuosarum regionum lacubus obvijs. In hominum cutem inter lavandum vel ambulandum in aqua lacustri se insinuare solet. Frequentissime crura & scrotum occupat. Hic vermis sæpe ad plurimum pedum longitudinem in tela cellulosa hominis, quem afficit,

increfcit, mufculorum tractus fequi amat, fubinde, quod pejus eft, offa serpentis adinfar amplectitur. Modo unus modo plures adefle deprehenduntur.

Hic vermis per annum in corpore latitat, & præter dolorem loci affecti nullum incommodum facit.

Non raro autem tumorem rubentem cum febre plurium dierum, quæ nuncia eft prodituri vermis, excitat. Exfurgit demum in tumore vefica pellucida, vel nigricans, ex qua rupta profilit roftellum vermis, qui fenfim magis erumpit, & ita extrahi paullatim poteft.

Curatio exigit, ut tumor cataplafmate lacteo emolliatur, dein ut erumpentis vermis portio circa ligulam rotetur, fic intra 10 circiter dies totus vermis, cavendo ne rumpatur, extrahi poteft. Ulcus extracto verme ut aliud curatur.

Enormis vermis longitudo, tarda maturatio, implicatio vermis circa offa vel mufculos, vermis ruptura, curationem longiorem, & difficiliorem reddunt.

5. *MALIS A SIRONIBUS.* Hoc infectum intra cutim fe infinuat & epidermidem in papulas attollit pruriginofas, rubras vel luteas, quæ fenfim exulcerantur. In planta pedis & volæ manus firones frequenter nidulari folent.

Curatio exigit, ut sironus acu effodiantur, & dein locus sebo deligetur: alii solutionem salis amari, alii unguentum amarum cum mercurio dulci adhibent.

6. *MALIS A LUMBRICO EFFRACTORE.*

Hic vermis ex intestinis in umbilico vel in inguinibus, præsertim in locis herniosis excitato abscessu erumpere solet. Relinquit fistulam subinde difficulter, subinde facile aqua thediana curabilem.

C R I N O N E S.

Sunt setæ lineam longæ, nigricantes & confertæ, quæ instar vermiculorum ex cute exprimi possunt.

SPECIES sunt:

1. *CRINONES INFANTUM.* Cutis dorfi, brachiorum & crurum in infantibus athrophiscis nigricantibus setis confertim obsidetur. Has setas aliqui pro vermiculis habent, & ideo *Comedones* vocant.

Curatio exigit, ut partes obsessæ bile bubula vel manu ex calido oleo olivarum madida, vel aqua calida, cui parum farinæ, aut pulveris cyprei additum est, alternis diebus fricentur.

2. *CRINONES ADULTORUM.* Puncta nigra referunt in facie, circa nasum, & in antica thoracis parte, quæ puncta digitis ex cute pressa simulacra vermiculorum cum capite nigro exhibent.

Sebum in folliculis cutaneis inspissatum & in externo apice corruptum, atque per porum excretorium glandulæ expressum, hos vermiculos cum capite nigro repræsentat.

Curatur lotione saponacea ex sapone, vel oleo tartari per deliquium & expressione sebi, vel, quod optimum censetur, felle taurino.

CLASSIS XIII. MORBI UNGUIUM.



Morbi, qui ungues infestare solent, sunt:

S E L I N E.

Est macula alba in vel sub ungue.

Macula autem albicans in radice unguis conspicua *lunula unguis* dicitur.

SPECIES sunt:

1. *SELINE A CARIE SICCA UNGUIUM*,
quæ vitri acuti fragmento tam diu radi debet, donec macula dispareat. Subinde spiritus vini camphoratus conducit.
2. *SELINE A PUSTULA SUB UNGUE*,
quæ rasuram unguis cum cultro exigit, ut pus exire possit.

ECCHYMOMA UNGUIS.

Est macula livida sub ungue.

SPECIES sunt:

1. *ECCHYMOMA VIOLENTUM*, quod a contusione, pressura, acupunctura unguis vel festuca sub unguem intrusa oritur.
Curatur fomento calido ex oxycrato vel vino.
2. *ECCHYMOMA A FRIGORE AERIS*.
Evanescit in calore.
3. *ECCHYMOMA A FRIGORE FEBRILI*.
Est livor unguium in stadio frigoris febrilis.
Evanescit in stadio caloris.
4. *ECCHYMOMA TRIHOMATICUM*. Ante eruptionem trichomatis aliquando omnes ungues nigerrimi fiunt, & abscedunt.

G R Y P H O S I S.

Est unguium, postquam longe excreverunt, incurvatio.

SPECIES sunt:

1. *GRYPHOSIS A NEGLECTA ABSCISSIONE*. * Curatio exigit abscissionem ope foricis scindentis vel ferrulæ, si unguis nimis durus.

* Hominibus, quoties ungues vel ex barbarie vel ex more aliquo antiquo omittunt refecare, ad 3 & 4 pollices & spithamam longi fiunt. HALLER *Physiol.* T. V. p. 30. CEL. CAMPER *Abh. von Schuh.* pag. 56. unguem pollicis majoris, qui super omnes reliquos digitos pedis excrecebat, adhucdum conservat inter sua præparata anatomico-pathologica.

2. *GRYPHOSIS ARESECTA PLICA POLONICA*. Inter alia symptomata potissimum unguium excrescentia mirabilis, cum scabritie & nigredine, ut ungues cornua hircina referant, observatur.

Curatio exigit ablationem trichomatis.

3. *GRYPHOSIS ANONYMA* seu a morbo ignoto. *

FISSURA UNGUIUM.

Est unguis solutio lineam referens.

SPECIES sunt:

1. *FISSURA CRUENTA*, quæ ab instrumento acuto infligitur, & unione ut vulnus curatur.
2. *FISSURA SICCA*, quæ sua sponte subinde observatur, aliquando autem luis venereæ vel lepræ effectus est.

Curatio instituaturs juxta morbum, a quo fissura pendet.

TINEA UNGUIUM.

Est unguis unius, vel plurium erosio seu corruptio ulcerosa.

* Ex morbo duos pollices longos ungues LINDENIUS in sua physiologia refert. Duas uncias longos in *Phil. Trans.* n. 297. quatuor cum dimidio JACOBÆUS conf. BARTOLINI anat. p. 57.

SPECIES sunt:

1. *TINEA SICCA*, V. *scabrities unguium*.

2. *TINEA HUMIDA*, in qua unguis mollis, rugosus, hinc inde corruptus & faniosus est.

CAUSA PROXIMA est depositio humoris acris, qui circa radicem unguis deponitur.

Id contingit in lue venerea, in impetigine, in plica polonica, in lepra & elephantiasi.

Curatio exigit, ut acrimonia suo specifico remedio auferatur.

Externe spiritus vini camphoratus cum mastiche prodest.

MOLLITIES UNGUIUM.

Est unguium tanta flexilitas, ut sine ruptura plicari, & corrugari possint. Hic morbus subinde a tinea unguium, subinde a chlorosi oritur.

Curatio. Mollities *tineosa* ut tinea unguis, mollities *chlorotica* martialibus curatur. *

SCABRITIES UNGUIUM.

Est unguium sicca, quasi cariota corruptio, qua unguis scaber, crassus, friabilis & inæqualis evadit.

Hic morbus etiam *tinea sicca* unguium vocari potest; subinde solam radicem, vel solum marginem adhæsivum, subinde totum unguem occupat.

* NIEMAN *Dissertatio epistolica de scæda unguium mollitie puellæ chloroticæ martialium usu feliciter curata.*
Magdeburg. 1774.

Oritur a valido labore, quo radix unguis vitiatur, aliquando etiam a causa interna nascitur.

Curatio exigit, ut frustum lardi corrupto ungui per aliquot septimanas firmiter applicetur.

PTERIGIUM UNGUIS.

Est epidermidis magna prolongatio & incrementum supra radices unguum.

Curatio exigit, ut epidermis obtuso cultro ab ungue separetur & reprimatur.

Ulcera circa marginem unguis frequenter *carnem fungosam*, quæ supra unguem proserpere videtur, formare solent. Hæc lapide infernali auferatur, & dein aqua cum aqua vulneraria ex cortice peruviano, aqua Thediana & extracto saturni parata exsiccetur.

ARCTURA UNGUIS.

Est unguis curvatura lateralis, cutem secans & exulcerans.

Noscitur inflammatione, dolore intenso & exulceratione laterali digiti, præsertim pollicis majoris in pede.

Oritur ab excisione nimis acuta marginis lateralis in ungue aut a calceis nimium angustis.

Curatio exigit, ut unguis medietas fragmento acuto vitri tandiu fricetur, donec margo lateralis sursum pergat; sub unguem ponitur linteum carptum, & ad ulcus applicetur extractum saturni,

aqua dilutum, vel aqua vulneraria viridis * vel aqua vulneraria chinata. **

Si hæc medicatio non juvat, discindatur forcice acutissima unguis a margine usque ad radicem, dein portio unguis carni increta, forcipe elevatur.

DEFORMITAS UNGUIS.

Est unguium monstrosum incrementum in formam unguiculæ avicularis vel cornu. ***

Curatio exigit abscissionem.

LAPSUS UNGUIUM.

Est unguis unius vel plurium spontaneus secessus a digito.

* *III. BALDINGER neues Magazin für Aerzte. 3. B. I. p. 26. vom Nagelgeschwür. R. vini albi ℥iij. viridis æris, aluminis aa ℥β, mellis ℥β. m. coquantur leniter.*

** Ego sequantem aquam centies egregiam sum expertus. R. Aquæ fontanæ ℥viiij. Aquæ Thediane ℥iiij. Extracti saturni. Salis ammoniaci aa ℥β. Cort. peruviani ℥j. m. f. aqua.

*** Historiam unguium, qui in vera cornua laminata abierunt, V. in *Histoir. de l'Academ. 1719. hist. I. Hominem quotidie coram me video, qui sibi digitum auricularem manus sinistræ in sua juventute intra portam adeo compresserat, ut totus unguis ablatus fuerit, renascebatur loco unguis cornu acutum, quod unguis substantiam habet, admodum crassum & longum fit, si non omni mense refecetur.*

CAUSÆ, quæ hunc lapsum efficiunt, sunt suppuratio sub vel circa radicem unguis, longa manuum maceratio in aqua calida, virus plicosum, vel aliud, & datum venenum.

A lapsu unguis ad minimum loci denudati attactum fiunt horrendi dolores.

Curatio requirit, ut inspergatur ad locum ab ungue nudum pulvis olibani vel mastichis, & molli cera, quæ unguis figuram referat, tegatur.

Sic unguis a sua radice incipit iterum crescere, & restitui.

CLASSIS XIV. MORBI PILORUM.

Morbos, qui pilos afficiunt, ut morbos unguium ad cutaneos refero, cum ungues & pili partes cutis esse censeantur.

Sunt autem *morbi pilorum* sequentes.

CALVITIES.

Est pilorum in capite vel alia parte crinita defectus.*

CAUSA PROXIMA est osculorum in bulbis, quæ pilos emittunt, nimia amplitudo, vel nimia arctitudo seu concretio vel bulbuli ipsius morbositas.

Dividitur generatim calvities

In *universalem*, si totum caput calvum glabrumque sit.

* D. PFEIFFER *diff. de calvitie*. Budæ 1783. Calvities Græcis *Φυλάκωσις*, vel *Maderosis* dicitur.

In *partialem*: si quidam tantum capillatæ partis locus capillis careat. Hæc species dicitur *Area* seu *Alopectia*, si locus depilis plagam: *Ophiafis* si locus calvus serpentem ab occipitio, ad frontem vel utrinque ad tempora pergentem referat. Datur demum calvities barbæ, axillarum, pubis, oculorum.

SPECIES sunt:

1. *CALVITIES FEBRISEQUA*, quæ febres acutas sequitur.
2. *CALVITIES PUERPERARUM*. Quibusdam mulieribus in omni puerperio plus minus defluunt capilli.
3. *CALVITIES MORBORUM EXANTHEMATICORUM*. Variolas aut erysipelas sæpe calvities sequitur.
4. *CALVITIES ACRIMONIOSA*. Huc pertinet calvities a prægressa tinea, achoribus, trichomate, lepra, lue venerea, scorbuto &c.
5. *CALVITIES PHTHISICORUM*. Est capillorum defluvium, quod in consummata phthisi vel hætica observatur.
6. *CALVITIES A DEBILITATÉ NERVOSA*: terror, veneris abusus, magna animi per curas agitatio, cephalæa inducere calvitiem. *

* Exempla de his omnibus collegit D. PFEIFFER. l. c. p. 14.

7. *CALVITIES SENUM* est naturalis capillorum defectus in syncipite & vertice senum.
8. *CALVITIES HÆREDITARIA*. Quæ multis familiis jam in ætate juvenili vel virili consueta est. In Insula Mycono infantes calvi dicuntur nasci vel 20 anno jam calvescunt. *
9. *CALVITIES A VAPORE MERCURII*, quæ in aurifabris quandoque observatur, & diætâ lactea curata fuit. **
10. *CALVITIES* a causa externa: ut a dropace, a mitra aspera &c.

Prognosis. Si locus calvus frictione non rubeat, tunc calvities incurabilis censetur. *** Senilis nunquam, hereditaria & inveterata, ut & universalis raro curatur. Palingenesia crinium quandoque diversi a prioribus coloris & figuræ est.

Curatio exigit, ut causa materialis calvitiei tollatur, dein ut oscula pilos emittentia nimis laxa roborantibus arctentur, nimis arcta relaxentur; impervia autem ope rasuræ referantur. Hinc præmissis catharticis antacrimoniosa, vel roborantia vel in siccitate humectantia interne dentur.

Externe specificè laudantur: rasura capitis, aqua stillatitia e favis apum, axungia ursi, lixivium cinerum, in quo hedera arborea vel malvæ radix

* TOURNEFORT *vog. en lev.* T. I. p. 333.

** FORESTI *observ. & curat.* L. 8. obs. 5.

*** ZACUTI *Prax. histor.* L. 7. C. I. p. 5.

vel buxus * infusus aut coctus, succus cæparum affridus, ladanum oleo solutum, succus tabaci, thapsiæ 3j cum axungia ursi 3j in unguentum redacta.

H I R S U T I E S.

Est pilorum exortus nimius, vel in toto corpore vel in loco non consueto.

CAUSA PROXIMA est bulborum progenies in loco non consueto vel affluxus nimius nutrimenti ad bulbos pilorum.

Nascuntur subinde fœtus adeo hirsuti, ut pro simiis habiti fuerint. Huc etiam refero feminas barbata & duplicia supercilia super uno oculo.

HIRSUTIES ergo vel *universalis* in tota corporis superficie est, vel *partialis* in uno tantum vel consueto vel inconsueto loco. **

* *Misc. N. C.* dec. 2. ann. 2. obs. 155. lixivio buxi incautius faciem & collum lotum non tantum in capite loto sed etiam in facie & collo copiose progerminasse fertur.

** Homo ex sua natura hirsutum est animal, totum pilis adpersum, si volam manus, plantam pedis, & penis glandem excipias, nam etiam in facie & mammis formosissimæ feminæ pili deprehenduntur. Quoties jam hi pili, qui vulgo breves manent in homine, in aliqualem longitudinem excrescunt, tunc homines *hirsuti* seu *pilosi* vocantur. Fœtus aliquando toti pilosi nascuntur, feminæ barbata & homines in tota facie pilosi fuere visi. In ovarii, aliarumque partium athe-

Curatio. Applicetur spiritus salis dulcis, qui mediante charta bibula apponitur, vel unguentum depilatorium ex auripigmento, calce viva & melle.

X E R A S I A.

Est capillorum nimia tenuitas, lanugini similis.

Curatio exigit, ut caput novacula abradatur, & sæpius unguento pomato inungatur, atque pulvere cyprio inspergatur. Decoctum buxi denique tentandum.

TRICHOMA seu PLICA POLONICA.

Est præternaturalis pilorum in quacunque pilosa corporis parte in funiculos vel pannos intricatio,* nulla arte humana extricabilis.

Dividitur plica.

In *cirrosam*, quæ plica *mas* vocatur, dum unus vel plures cirri contorti e parte crinita instar caudarum glirium pendent.

romatibus frequenter pili crispi & alii inveniuntur. Sic etiam in omento, in ventriculo pili effloruerunt, lingua non raro pilosa evadit. Pilam capillorum super musculum rectum abdominis, & in carne bubula folliculum, in quo intricati pili erant, descripserunt Authores. V. Ill. HALLERI *elementa Physiologiæ* T. V. p. 32. & 33.

* Vide egregiam *diff.* D. GABRIEL de *Plica polonica.* Budæ. 1780. & Cel. VICAT *Mémoires sur la plique polonoise.*

In *villosam*, quæ plica *femina* dicitur, dum omnes fere crines in se mutuo intertexti speciem pilei villosi seu mitræ vel panni cujusdam rigidi efformant.

Sedes. Caput capillatum plerumque huic malo obnoxium est, tamen etiam in barba, & in pube visa est plica. Brutis e juba aut cauda erumpit. Longitudo ejusdem quandoque enormis est.

CAUSA PROXIMA est peculiare miasma, quod uberio-rem & criticum secessum succi crines nutrientis causat. Indoles atque origo hujus miasmatis adhuc ignoratur. Hoc miasma ex India orientali circa annum 1687 per Tartaros in Poloniam, Silesiam, Hungariam, Sarmatiam, Russiam, & loca vicina inventum fuisse creditur. In aliis regionibus vix conspicuus est morbus.

Morbi contagium *nativitate* a parentibus trichomatosis, vel concubitu cum homine infecto vel usu lecti, vestimentive miasmate infecti, communicatur.

SPECIES sunt:

I. TRICHOMA LATENS seu OCCULTUM.

Ante plicæ eruptionem per plures menses atrocissimus capitis dolor adest cum sudore viscido crinium, noctu molesto, copiosisque furfuribus locum plicæ, ubi erumpit, conspurcantibus. Arthritis vaga & fixa, pleuritis, cardialgia, colica, œdema crurum, glandularum infarctus, tubercula cutanea, tophi arthritici, ulcera oris, narium, viscerum febres variæ auctæ &

intermittentes, deliria acuta & chronica, convulsiones, spasmi, paralyses, paretēs, alvi fluxus, hæmorrhagiæ, oculorum varii morbi, ophthalmia, amaurosis, dolor, pica, unguēs scabri, lividi, recurvi, corrupti, quandoque humores pilosi sub cute cranii latentes. *

2. *TRICHOMA EVOLUTUM*. Critica plicæ excretio per longum tempus durat, perfecta cognoscitur fuga omnium symptomatum, capillorum defludio, qui dein resarciuntur.

3. *TRICHOMA SUPPRESSUM* a resecta ante perfectam crisin plica, iidem oriuntur morbi, quos in latente trichomate adnotavimus, qui redeunte plica iterum evanescunt. Tolluntur hi morbi

1. Plicæ spontanea eruptione.

2. *Phthiriasi* cum porriginē, & sudore fœtido capitis.

3. *Alopecia* spontanea.

4. Datis medicamentis specificis contra plicam.

4. *TRICHOMA SPURIUM*. Est capillorum intricatio, quæ a neglecta pectinatione & sordida porriginē capitis nascitur. ** Absentia sym-

* GABRIEL l. c. p. 21.

** Cel. VICAT l. c. p. 46.

ptomatum in trichomate vero consuetorum cognoscitur.

Curatur resectione capillorum & purificatione capitis. V. *Achores*.

Curatio. Cum antidotum hujus miasmatis adhuc desideretur, necesse est

1. Ut *latens* miasma excernatur:
2. — *excretum* non repellatur, aut
3. — *retropulsum* iterum in capillitium revocetur.

LATENS miasma ad excretionem invitatur 1. ope fomentorum calidorum, capillitio capitis diu applicatorum. Optimum est caput decocto lycopodii bis de die lavare, vel unguento lycopodii, bis de die illinere. * *Arnica* aut roris marini flores in aqua vel cerevisia cocti, specificè ad hunc scopum laudantur. 2. *Interne* idem decoctum lycopodii vel infusum *arnicae*, aut roris marini ** cum sale succini, aut viperarum tamdiu exhibetur, donec symptomata remittant & plica prodeat.

In casu graviori adhibentur vesicatoria ad nucham, theriaca, tinctura metallorum, pulvis ex sulphure aurato antimonii, & camphora. Decoctum *sarsaparillae* & radicis *serpentariae virginianae*.

* GABRIEL l. c. p. 78.

** Hebræo plica polonica laboranti infuso roris marini arthritidem & cephalæam nuper curavi, plica etiam emendabatur, at ægrotus paullo post aufugiebat.

Unguibus apponatur cera rubra mollis ad sigillandum usualis.

Purgantia valentiora, emetica, mercurialia, nitrofa copiose data, atque venæsectio morbum valde exasperant. Rescissio plicæ & capillorum est summe exitialis, cum pessimi exinde morbi subsequantur. Sed spontaneus plicæ delapsus, qui vero admodum raro contingit, subinde salutarius fuit. *

FISSURA CAPILLORUM.

Est spontanea dehiscencia capillorum in duo vel plura filamenta. **

Rarissime vel nunquam ad cutem usque capilli finduntur, sed tantummodo in fine extremo.

CAUSA PROXIMA est capillorum aridura, vel vitiosus succus, vel abundantia succi capillaris. Hinc capilli fissi sæpe defluunt.

* Interim tamen tonsio capitis aliquando utilis fuit. De plica valde immunda tonsione capitis sanata observationem habet TRIOEN v. ejus *observationes*. Cl. Prof. Pragensis MIKAN curavit feminæ, jam a multis annis plicosæ, capillos abscindi; altero die enormis capitis dolor, vertigo & debilitas sequuntur, multa remedia gratis tentantur, omnia in pejus ruunt, demum capilli penitus abraduntur, & sic hæc femina integre convaluit.

** Græcis hic morbus dicitur *Dichophyia*.

Curatio exigit, ut capitiluvia ex herbis aromaticis & recens unguentum pomatum adhibeatur. *Interne* dentur, quæ sanguinem purificant.

C A N I T I E S.

Est coloris capillorum mutatio in album vel gryseum colorem.

CAUSA PROXIMA esse videtur exsiccatio seu aridura bulborum capillarium. *

SPECIES sunt:

1. *CANITIES SENILIS*, quæ senectutis est naturalis effectus. Quibus venerabile hoc senectutis ornamentum displicet, hi caput suum cæsarie adscititia tegere, aut frequenti pectinatione cum pectine plumbeo colorem nigrum inducere tenentur. Sunt demum, qui cum solutione lapidis infernalis capillos nigricant.
2. *CANITIES PRÆMATURA*, quæ in ætate juvenili vel virili jam contingit. Hæc canities sæpe hereditaria est, sæpe magnum terrorem, aut morbum sequitur. * *Tractatur* ut canities senilis.

* In senibus, omnibus in regionibus capilli canescunt, cum solus nunc epidermidis color supersit exhausta medulla, a quo color erat, & pellucidi sunt ut vitrum album, dicit *Ill. HALLERUS*, bulbos etiam minores esse ajunt.

** Subito aliquos a terrore canuisse multi auctores sunt *V. Ill. HALLERI elementa Physiol. T. V. p. 37.*

INDEX GENERUM.

	Pag.		Pag.
A.		E.	
Achores.	74	Ecchymoma.	29
Albor.	35	———— unguis.	121
Alphus.	34	Elephantiasis.	71
Anserina cutis.	64	Ephelis.	17
Aphthæ.	104	Erythema.	22
Arctura unguis.	125	Eschara.	74
Asperitas cutes.	90	Efferæ.	25
		Exanthema labiale.	83
		———— subaxillare.	83
B.		Excreſcentiæ cutaneæ.	96
Bullæ.	57	Excoriatio cruenta.	109
———— ſolitaria.	58	———— purulenta.	102
		Exuvia epidermidis.	84
		F.	
C.		Fiffura.	106
Callus.	91	———— capillorum.	135
Calvities.	127	———— unguium.	123
Canities.	136	Flavedo cutis.	19
Cicatrix.	92	Frambæſia.	101
Clavus.	94	Fucata cutis.	39
Condyloma.	99	Furfuratio.	84
Cornua curanea.	98	Fufcedo.	18
Cruſtæ.	73		
———— capitis neonatorum.	77	G.	
Cruſtæ lactea.	77	Grutum.	61
Crinones.	120	Gryphofis.	122
		Gutta roſacea.	19
		H.	
D.		Helminthiaſis.	116
Deformitas unguis.	126	Herpes.	61
Deſquammatiô.	84		

I N D E X.

	Pag.
Hirsuties.	130
Hydatis.	55
Hystriicias.	99

I.

Ichthiosis.	89
Ictus ab insecto.	112
Impetigo.	86
Insecta cutanea.	114
Intertrigo.	103
Jonchi.	60

L.

Lapsus unguium.	126
Lentigo.	16
Lepra.	67
Lichen.	86
Livor cutis.	30

M.

Maculæ.	15
—— artificiales.	38
—— gongranosæ.	31
—— lata Plateri.	28
—— maternæ.	36
—— scorbuticæ.	31
Malis.	117
Malum mortuum.	83
Melas.	32
Melasma.	32
Mentagra.	82
Miliare.	55
Milium.	61
molities unguium.	124
Morsus.	111

N.

Nigredo cutis.	33
Noma.	33

Pag.

P.

Pallor cutis.	35
Papulæ.	60
Pemphygus.	59
Petechiæ.	31
Phlyctenæ.	54
Phtyriasis.	115
Phygethlon.	66
Phyma.	57
Plica.	131
Porrigo.	85
Pressura.	110
Pydraciæ.	26
Pterigio unguis.	125
Punctura.	111
Pustulæ.	40
—— solitariae.	41

R.

Rhagades.	107
Rubedo.	26
Rugosa cutis.	90

S.

Scabies.	41
—— capitis.	74
Scabrities unguium.	124
Scissura.	100
Seline.	121
Serpigo.	61
Squamæ.	84
Stigma.	21
Sudamina.	54

T.

Terminthus.	53
Tinea.	81
—— unguium.	123
Trichoma.	131

I N D E X

	<i>Pag.</i>		<i>Pag.</i>
Tuberculum.	65	Vibices.	30
Tyriasis.	89	Ulcera.	102
V.			
Vari.	60	Unctuosa cutis.	40
Varicellæ.	52	Uritis.	57
Variegata cutis.	38	Urticatæ.	25
Variolæ.	46	Vulnera cutanea.	109
Verruca.	96	X.	
Vesiculæ.	54	Xerasia.	131
— cristallinæ geni-		Z.	
talium.	56	Zona S. Zoster.	27



